

第一章 多项式习题解答

P44.1 1) $f(x) = g(x)\left(\frac{1}{3}x - \frac{7}{9}\right) + \left(-\frac{26}{9}x - \frac{2}{9}\right)$

2) $f(x) = g(x)(x^2 + x - 1) + (-5x + 7)$

P44.2 1) $x^2 + mx - 1 \mid x^3 + 9x + q \Rightarrow$ 余式 $(p + 1 + m^2)x + (q - m) = 0$

$$\therefore \begin{cases} m = q \\ p = q^2 - 1 \end{cases}$$

方法二,

设 $x^3 + px + q = (x^2 + m - 1)(x + q) \Rightarrow \begin{cases} m - q = 0 \\ -mq - 1 = p \end{cases}$ 同样。

2) $x^2 + mx + 1 \mid x^4 + px^2 + q \Rightarrow$ 余式 $m(p + 2 - m^2)x - (q - p + 1 + m^2) = 0$

$\therefore m(m^2 + p - 2) = 0. \quad m^2 + p = 1 + q, (x^2 = 1 - p + q)$

P44.3.1 用 $g(x) = x + 3$ 除 $f(x) = 2x^5 - 5x^3 - 8x$

解:

$\therefore f(x) = 2(x+3)^5 - 30(x+3)^4 + 175(x+3)^3 - 495(x+3)^2 + 667(x+3) - 327$

P44.3 .2)

$$\begin{aligned} & \therefore (x^3 - x^2 - x) \\ &= (x-1+2i)^3 + (2-8i)(x-1+2i)^2 \\ &\quad -(12+8i)(x-1+2i) - (9-8i) \\ &\quad \text{即余式 } -9+8i \\ &\quad \text{商 } x^2 - 2ix - (5+2i) \end{aligned}$$

P44.4.1). $f(x) = x^5, x_0 = 1$: 即

$\therefore f(x) = (x-1)^5 + 5(x-1)^4 + 10(x-1)^3 + 10(x-1)^2 + 5(x-1) + 1$

当然也可以 $f(x) = x^5 = [(x-1)+1]^5$

$= (x-1)^5 + 5(x-1)^4 + \dots + 1$

P44.4 2) 结果

3) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3 = (x+2)^4 - 8(x+2)^3 + 22(x+2)^2 - 24(x+2) + 11$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + 2ix^3 - (1+i)x^2 + 3x + 7 + i \\ &= (x+i-i)^4 + 2i(x+i-i)^3 - (1+i)(x+i-i)^2 - 3(x+i-i) + 7 + i \\ &= (x+i)^4 - 2i(x+i)^3 + (1+i)(x+i)^2 - 5(x+i) + 7 + 5i \end{aligned}$$

P45.5

(1) $g(x) = (x-1)(x^2 + 2x + 1) = (x-1)(x+1)^2$

$f(x) = (x+1)(x^3 - 3x - 1)$

$\therefore (f(x), g(x)) = x+1$

$$(2) g(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \text{ 不可约}$$

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 1 \text{ 不可约}$$

$$\therefore (f(x), g(x)) = 1$$

$$(3) f(x) = x^4 - 10x^2 + 1 = (x^2 + 2\sqrt{2}x - 1)(x^2 - 2\sqrt{2}x - 1)$$

$$g(x) = x^4 - 4\sqrt{2}x^3 + 6x^2 + 6\sqrt{2}x + 1, f(x) = 4\sqrt{2}(-x^3 + 2\sqrt{2}x^2 + x) = (x^2 - 2\sqrt{2}x - 1)^2 \therefore$$

$$(f(x), g(x)) = x^2 - 2\sqrt{2}x - 1$$

P45.6

$$(1) f(x) = (x+1)^2(x^2 - 2) \quad g(x) = (x^2 - 2)(x^2 + x + 1)$$

$$\therefore (x+1)^2[-(x+1)] + (x^2 + x + 1)(x+2) = 1$$

$$\therefore (x^2 - 2) = -(x+1)f(x) + (x+2)g(x)$$

$$(2) f(x) = (x-1)(4x^3 + 2x^2 - 14x - y), \quad g(x) = (x-1)(2x^2 + x - 4)$$

$$= (x-1)f_1(x) \quad = (x-1)g_1(x)$$

而

$$f_1(x) = g_1(x) \cdot 2x - 3(2x + 3)$$

$$g_1(x) = (2x + 3) \cdot (x - 1)$$

$$\therefore 1 = (2x + 3)(x - 1) - g_1 = \left(\frac{2x}{3}y_1 - \frac{1}{3}f_1\right)(x - 1) - g_1$$

$$\therefore x - 1 = -\frac{1}{3}(x - 1)f(x) + \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 1\right)g(x)$$

$$(3) f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, \quad g(x) = x^2 - x - 1$$

$$\therefore f(x) = g(x)(x^2 - 3) + (x - 2), \quad g(x) = (x - 2)(x + 1) + 1$$

$$\therefore 1 = -(f - g(x^2 - 3))(x + 1) + g$$

$$= -(x + 1)f(x) + (x^3 + x^2 - 3x - 2)g(x).$$

P45.7

$$f(x) = g(x)1 + (1+t)x^2 + (2-t)x + u = r(x)$$

$$g(x) = r(x)\left(\frac{1}{1+t}x + \frac{t-2}{(1+t)^2}\right) + \frac{(t^2 + t + u) + (t-2)^2}{(1+t)^2}x + \left(1 - \frac{t-2}{(t+1)^2}\right)u$$

由题意 $r(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式应为二次所以 $r(x) | g(x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{t^3 + 3t^2 - (u+3)t + (4-u)}{(1+t)^2} = 0 \\ \frac{t^2 + t + 3}{(1+t)^2}u = 0 \end{array} \right.$$

$t \neq -1$ 否则 $r(x)$ 为一次的

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} t^3 + 3t^2 - (u+3)t + (4-u) = 0 \\ (t^2 + t + 3)u = 0 \end{array} \right.$$

解出(i)当 $u=0$ 时 $t^3+3t^2-3t+4=0(t+4)(t^2-t+1)$

$$\therefore t=-4 \text{ 或 } t=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}=e^{\pm\frac{\pi}{3}i}$$

(ii) 当 $u \neq 0$ 时, 只有 $t^2+t+3=0, \frac{1}{t+1}=-\frac{t}{3}$

$$t^3+3t^2-(u+3)t+(4-u) \Rightarrow u=\frac{t^3+3t^2-3t+4}{t+1}=-\frac{t}{3}(t^3+3t^2-3t+4)$$

$$\therefore u=-\frac{1}{3}[(t^2+t+3)(t^2+2t-8)+6t+24]=-2(t+4)$$

$$\begin{cases} u=-2(t+4) \\ t^2+t+3=0 \end{cases}$$

$$t=\frac{-1\pm\sqrt{-11}}{2}$$

P45、8 $d(x) | f(x), d(x) | g(x)$ 表明 $d(x)$ 是公因式

又已知: $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合 表明任何公因式整除 $d(x)$

所以 $d(x)$ 是一个最大的公因式。

P45, 9. 证明 $(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x)h(x))$ ($h(x)$ 的首项系数=1)

证: 设 $(f(x)h(x), g(x)h(x)) = m(x)$ 由

$$(f(x), g(x))h(x) | f(x)h(x) \quad (f(x), g(x))h(x) | g(x)h(x).$$

$\therefore (f(x), g(x))h(x) | m(x) \quad \therefore (f(x), g(x))h(x)$ 是一个公因式。

设 $d(x) = (f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.

$$\therefore d(x)h(x) = (f(x), g(x))h(x) = u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x).$$

而首项系数=1, 又是公因式得 (由 P45、8), 它是最大公因式, 且

$$(f(x), g(x))h(x) = (f(x)h(x), g(x)h(x)).$$

P45、10 已知 $f(x), g(x)$ 不全为 0。证明 $(\frac{f(x)}{(f(x), g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x), g(x))}) = 1$.

证: 设 $d(x) = (f(x), g(x))$. 则 $d(x) \neq 0$.

$$\text{设 } \frac{f(x)}{d(x)} = f_1(x), \quad \frac{g(x)}{d(x)} = g_1(x), \quad \text{及 } d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

$$\text{所以 } d(x) = u(x)f_1(x)d(x) + v(x)g_1(x)d(x).$$

$$\text{消去 } d(x) \neq 0 \text{ 得 } 1 = u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x)$$

P45.11 证: 设 $(f(x), g(x)) = d(x) \neq 0, f(x) = f_1(x)d(x), g(x) = g_1(x)d(x)$

$$\therefore u(x)f_1(x)d(x) + v(x)g_1(x)d(x) = d(x), u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1$$

P45.12

设 $uf + vg = 1$, $u_1f + v_1h = 1 \Rightarrow uu_1f^2 + ufv_1h + vgu_1f + vu_1gh = 1$
 $\therefore (uu_1f + uv_1h + vgu_1)f + (v_1u)gh = 1 \Rightarrow (f, gh) = 1$

P45.13

$$\therefore (f_i, g_i) = 1,$$

$$\text{固定 } i : (f_i, g_1g_2) = 1$$

$$(f_i, g_1 \cdot g_2 \cdot g_n) = 1$$

P45.14

$$(f, g) = 1 \Rightarrow uf + vg = 1 \Rightarrow (u - v)f + v(g + f) = 1 \Rightarrow (f, g + f) = 1$$

$$\text{同理 } (g, g + f) = 1$$

$$\text{由 12 题 } (fg, f + g) = 1$$

$$\text{令 } g = g_1g_2 \cdots g_n$$

$$\therefore \text{每个 } i, (f_i, g) = 1$$

$$\Rightarrow (f_1f_1, g) = 1,$$

$$\Rightarrow (f_1f_2f_3, g) = 1,$$

$$\Rightarrow (f_1f_2 \cdots f_m, g_1g_2 \cdots g_n) = 1 \quad (\text{注反复归纳用 12 题})$$

推广

若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $\forall m, n$ 有 $(f(x)^m, g(x)^n) = 1$

P45.15

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1, g(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$$

$$\text{解: } g(x) = f(x)(x-1) + 2(x^2 + x + 1),$$

$$f(x) = (x^2 + x + 1)(x + 1)$$

$$\text{即 } (f(x), g(x)) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{令 } (x^2 + x + 1) = 0 \text{ 得 } \mathcal{E}_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \mathcal{E}_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$$

$\therefore f(x)$ 与 $g(x)$ 的公共根为 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$.

P45.16 判断有无重因式

$$\textcircled{1} f(x) = x^5 - 5x^4 + 7x^3 + 2x^2 + 4x - 8 \quad \textcircled{2} f(x) = x^4 + 4x^2 - 4x - 3$$

$$\text{解 } \textcircled{1} f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 21x^2 - 4x + 4$$

$$5f(x) = f'(x)(x-1) - 3(2x^3 - 5x^2 - 4x + 12)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x^3 - 5x^2 - 4x + 12)(5x - \frac{15}{2}) + \frac{49}{2}(x^2 - 4x + 4) \\ &= (2x^3 - 5x^2 - 4x + 12)(2x + 3) \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 有重因式 $(x-2)^3$

$$\textcircled{2} f'(x) = 4x^3 + 8x - 4$$

$$f(x) = (x^3 + 2x - 1)x + (2x^2 - 3x + 3)$$

$$f'(x) = (2x^2 - 3x + 3)(2x + 3) + (11x - 13)$$

$$11(2x^2 - 3x + 3) = (11x - 13)(2x - \frac{6}{11}) + (33 + \frac{6 \times 13}{11})$$

$$\therefore (f(x), f'(x)) = 1$$

P45.17 $t = ?$ 时 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重因式 (有重根)

$$\text{解. } f'(x) = 3x^2 - 6x + t \quad 3f(x) = f'(x)(x-1) + (2t-6)x + (t-3)$$

如 $t = 3$ 则 有重因式: 3 重因式 $(x-1)^3 = f(x)$

$$\text{如 } t \neq 3. \text{ 则 } 2f'(x) = (2x+2)(3x - \frac{15}{2}) + (2t + \frac{15}{2})$$

$$\text{此时必须 } t = -\frac{15}{4} \quad \text{有重因式 } f(x) = (x + \frac{1}{2})^2(x - 4)$$

P45.18 求多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 有重根因式的条件

证 $f(x) = 3x^2 + p$

$$3f(x) = (3x^2 + p)x + 2px + 3q \quad (p \neq 0)$$

$$(3x^2 + p) = (2px + 3q)(\frac{3}{2p}x - \frac{3a}{4p^2}) + (p + \frac{27q^2}{4p^2})$$

$$\therefore 4p^3 + 27q^2 = 0$$

p45.19 令 $f(x) = Ax^4 + Bx^2 + 1$, 因为 $(x-1)^2 \mid f(x)$, 所以 $(x-1) \mid f'(x)$

$$\text{即 } f'(x) = 4Ax^3 + 2Bx = (x-1)(ax^2 + bx + c)$$

$$\begin{cases} a = 4A \\ b - a = 0 \\ c - b = 2B \\ -c = 0 \end{cases} \quad \therefore 4A = a = b = -2B \quad \therefore 2A + B = 0$$

$$\text{又 } (x-1)f(x) \Rightarrow f(x) = (x-1)(a'x^3 + b'x^2 + c'x + d')$$

$$\begin{cases} a' = A \\ b' - a' = 0 \\ c' - b' = 0 \\ -d' = 1 \end{cases} \quad \therefore a' = A \quad b' = a' \quad -1 - b' = B \quad \therefore A + B + 1 = 0$$

$$\therefore A = 1, B = -2$$

P46, 20 证 $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ 无重因式 (重根)

$$\text{证: } f'(x) = f(x) - \frac{x^n}{n!}$$

$$\therefore (f', f) = \left(f, \frac{x^n}{n!}\right) \because (f, x) = 1 \quad (f, x^n) = 1 \Rightarrow f(x) \text{无重因式}$$

P46, 21

$$g'(x) = \frac{1}{2} [f'(x) + f'(a)] + \frac{x-a}{2} f''(x) - f'(x) \Rightarrow g'(a) = 0$$

又 $g(a) = 0$

$$g''(x) = \frac{1}{2} f'''(x) + \frac{1}{2} f''(x) + \frac{x-a}{2} f'''(x) - f''(x) = \frac{1}{2}(x-a)f''(x) \Rightarrow g''(a) = 0$$

$$g'''(x) = \frac{1}{2} f''''(x) + \frac{x-a}{2} f^{(4)}(x)$$

$\therefore a$ 是 $g(x), g'(x), g''(x), g'''(x)$ 的根，且使 $g''(x)$ 的 $k+1$ 重根

$\therefore a$ 是 $g(x)$ 的 $k+3$ 重根。

P46, 22

“ \Leftarrow ” 必要性显然（见定理 6 推论 1）

“ \Rightarrow ” 若 x_0 是 $f(x)$ 的 t 重根， $t > k$ ，

由定理 $\Rightarrow f^{(k)}(x_0) = 0$

若 $t < k \Rightarrow f^{(k-1)}(x_0) \neq 0$ ，所以矛盾。

P46.23

例如 $f(x) = x^{m+1}$ ，则 $x=0$ 是 $f'(x) = (m+1)x^m$ 的 m 重根

但 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的根。

P46.24 若 $(x-1) | f(x)^n$ 则 $(x^n-1) | f(x^n)$

证若 $f(x) = (x-1)g(x) + r$ (由上节课命题 2)

$$f(x^n) = (x^n-1)g(x^n) + r = \bar{g}(x) + r \Rightarrow r = 0$$

所以 $x^n-1 | f(x^n)$

P46.25

证明 设 x^2+x+1 的两个根 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_i^3 = 1$

$$x^2 + x + 1 = (x - \varepsilon_1)(x - \varepsilon_2)$$

$$\therefore \begin{cases} f_1(\varepsilon_1^3) + \varepsilon_1 f_2(\varepsilon_1^3) = 0 \\ f_2(\varepsilon_2^3) + \varepsilon_2 f_1(\varepsilon_2^3) = 0 \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} f_1(1) + \varepsilon_1 f_2(1) = 0 \\ f_1(1) + \varepsilon_2 f_2(1) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_2(1) = 0 \quad f_1(1) = 0$$

$$\Rightarrow (x-1) \mid f_1(x), f_2(x)$$

P46、26 分解 $x^n - 1$.

$$\text{设 } \varepsilon_0 = 1 \quad \varepsilon_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$(i) \text{ 在 } \mathbb{C} \text{ 中, } x^n - 1 = \prod_{i=0}^{n-1} (x - \varepsilon_i) = (x-1) \prod_{k=1}^{n-1} (x - (\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}))$$

$$(ii) \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 中, } n \text{ 为奇数} \quad x^n - 1 = (x-1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} (x - \varepsilon_k) = (x-1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} (x - \varepsilon_k)(x - \varepsilon_{n-k})$$

$$n = 2m-1 \quad = (x-1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} (x^2 - 2 \cos \frac{2k\pi}{n} x + 1)$$

$$\text{当 } n = 2m \text{ 时: } x^n - 1 = (x-1)(x+1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} (x^2 - 2 \cos \frac{2k\pi}{n} x + 1)$$

p46,27 求有理根:

$$(1) \quad x^3 - 6x^2 + 15x - 14 = f(x).$$

解: 有理根可能为 $\pm 1, \pm 2, \pm 7, \pm 14$ 。

\because 当 $a < 0$ 时 $f(a) < 0$, 所以 $f(x)$ 的有理根是可能 $1, 2, 7, 14$

$$f(1) = -4 \neq 0, f(2) = 0, f(7) = 140 \neq 0, f(14) = 1764 \neq 0, \text{ 只有一个 } x=2$$

$$(2) \quad 4x^4 - 7x^2 - 5x - 1 = f(x).$$

解: 有理根可能为 $\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}$, $\because f(1) = -9 \neq 0, f(-1) = 1 \neq 0$,

$$f(\frac{1}{2}) = -5, f(-\frac{1}{2}) = 0, f(\frac{1}{4}) = -2 \frac{43}{64}, f(-\frac{1}{4}) = -\frac{11}{64}$$

所以 $f(x)$ 只有一个有理根 $x = -\frac{1}{2}$

$$(3) \quad f(x) = x^5 + x^4 - 6x^3 - 14x^2 - 11x - 3 = f(x).$$

解: 可能有有理根为 $\pm 1, \pm 3$, $f(1) = -32, f(-1) = 0, f(3) = 0, f(-3) = -96$

故 $f(x)$ 有两个有理根 $-1, 3$

P46,28

① x^2+1 : 解 $y=y+1, x^2+1=y^2+2y+2$ 不可约

② $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$ 解取 $P=2$, 由Eisenstein判别法, 不可约。

③ x^6+x^3+1 , 解令 $x=y+1$ 则

$x^6+x^3+1=y^6+6y^5+15y^4+21y^3+15y^2+9y+3$ 取 $P=3$ 即可。

④ x^p+px+1 为奇素数

$$\text{解: 取 } y=x+1, \quad x^3+px+1=y^p+\sum_{i=1}^p (c_p^i y^{p-i} (-1)^i + p(y-1)+1)$$

$$=y^p+\sum_{i=1}^{p-2} (c_p^i (-1)^i y^{p-i} + 2py - p)$$

取 p 素数, 即可

⑤ $x^4+4kx+1$ k 为整数

解: 令 $x=y+1$, 则 $f(x)=x^4+4kx+1=y^4+4y^3+6y^2+(4+4k)y+(4k+2)$

取 $p=2$, 则 $p^2|4k+2$,

即可由Eisenstein判别法, $f(x)$ 于 $\mathbb{Z}(\mathbb{Q})$ 上不可约。

P47.1: 证 $\because f_1, g_1$ 都是 f, g 的组合, 所以若 $c(x)$ 是 f, g 的公因式, 则必有 $c(x) | f_1, c(x) | g_1$, 为 f_1, g_1 的公因式, 即

$$CD\{f(x), g(x)\} \subseteq CD\{f_1(x), g_1(x)\}$$

反过来, 得 $f(x) = \frac{1}{ad-bc}(df_1(x) - bg_1(x)), g(x) = \frac{1}{ad-bc}(-cf_1(x) + ag_1(x))$

$\therefore f, g$ 也是 f_1, g_1 的组合, 同上理, 有

$$CD\{f_1(x), g_1(x)\} \subseteq CD\{f(x), g(x)\}$$

即, f 与 g 和 f_1 与 g_1 的公因式一致, 最大公因式也一致, 那

$$(f(x), g(x)) = (f_1(x), g_1(x))$$

注: 不可约多项式也称既约定多项式

$f(x) \neq 0, a$, 则 $f(x)$ 不是既约, 则称 $f(x)$ 可约

P47.2

证: $\because d_1(x)f(x) \neq v_1(x)g(x) \Rightarrow (f(x), g(x)) = d(x)$.

$f(x) = f_i(x)d(x), g(x) = g_i(x)d(x)$

$\therefore u_1(x)f_i(x) + v_1(x)g_i(x) = 1$ 带余除法

$$\text{令 } u_1(x) = q_1(x)g_i(x) + u(x) \quad \hat{\partial}(u) < \hat{\partial}(g_i(x)) = \hat{\partial}(g(x) + y(x))$$

$$\begin{aligned}
v_1(x) &= q_2(x)f_1(x) + v(x) \quad \partial(v) < \partial(f_1(x)) = \partial(f(x)/(f(x), g(x))) \\
\text{则 } fu + gv + fg_1q_1 + f_1gq_2 &= f(x)u(x) + g(x)v(x) + f_1(x)g_1(x)d(x)(q_1 + q_2) = d(x) \\
\therefore d - (uf + vg) &= f_1g_1d(q_1 + q_2), \text{ 左边次数} < \partial(f_1) + \partial(y_1) + \partial(d) \leq \text{右边次数} \\
\text{故左、右两侧只有为 } 0, \quad d - (uf + vg) &= 0 \\
u(x)f(x) + v(x)y(x) &= d(x) \\
\text{且 } \partial(u(x)) &< \partial(g_1(x)), \quad \partial(v(x)) < \partial(f_1(x))
\end{aligned}$$

P47.3 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素，则 $\forall m \geq 1, f(x^m)$ 与 $g(x^m)$ 也互素

证： $\because f(x)$ 与 $g(x)$ 互素， $\therefore \exists u(x), v(x), u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$
由推厂令 $\varphi(x) = x^m, u(x^m)f(x^m) + v(x^m)g(x^m) = 1$
 $\therefore (f(x^m), g(x^m)) = 1$, 即 $f(x^m)$ 与 $g(x^m)$ 互素

P47 补 4

由定义有 $(f_1, f_2 \cdots f_s) = ((f_1, \cdots, f_{s-1}), f_s)$,

证明 $\exists d_i(x)$ 使得 $u_1f_1 + u_2f_2 + \cdots + u_sf_s = (f_1, f_2 \cdots f_s)$.

证：设 $d = (f_1, f_2 \cdots f_s), \quad d_1 = (f_1 \cdots f_{s-1}) \quad d' = (d_1, f_s)$

显然 $d | f_s$ 及 $d | d_1 \Rightarrow d | d'$,

反之， $d' \Rightarrow d | d_1$ ， $d' | f_s \Rightarrow d | f_i \ (\forall i) \Rightarrow d' | d$ 。

又 d, d' 首项系数 = 1 $\Rightarrow d = d'$.

证：由归纳方式 $\exists u_i'$ ，使 $u_1'f_1 + \cdots + u_{s-1}'f_{s-1} = d_1$ ，又 $\exists v, u$ 使得 $vd_1 + u_s f_s = d'$ ，

$$\begin{aligned}
\therefore d = d' &= vd_1 + u_s f_s = v \left(\sum_{i=1}^{s-1} u_i' f_i \right) + u_s f_s \quad \text{令 } u_i = vu_i' \quad i=1, 2, \dots, s-1 \\
&= u_1 f_1 + \cdots + u_{s-1} f_{s-1} + u_s f_s.
\end{aligned}$$

P48, 补 5

证明 若： $f(x)g(x)$ 首项系数都 = 1 则 $[f, g] = \frac{fg}{(f, g)}$

证：令 $(f, g) = d, f = f_1d, g = g_1d$, 则 $(f_1, g_1) = 1$, 设 $m(x) = f_1g_1d$

显然① $f | m, g | m$, 故 m 是一个公倍式

再设② $f|l, g|l \therefore d|l$, 令 $l=dl_1$, $\Rightarrow f_1|l_1, g_1|l_1$

$\because (f_1g_1)=1$, $\therefore f_1g_1|l_1 \Rightarrow f_1g_1d_1|l$ 即 $m|l$

m 是 f, g 的一个最小公倍式

$$\frac{f(x) \cdot g(x)}{(f(x) \cdot g(x))}$$

即证得: $[f(x), g(x)] = f_1(x)g_1(x)d(x)$

p48.7: $f(x)$ 首项系数 $= 1$. $\partial(f(x)) > 0$, 则 $f(x)$ 为某不可约多项式 $p(x)$

的方幂的充要条件是 $\forall g(x)$ 或者 $(f, g) = 1$ 或者 $\exists m: f(x) | g^m(x)$

证明 " \Leftarrow " 反设不是, 则 $f(x) = p_1^r(x)h(x)$, 而 $\partial(h(x)) > 0$, $p_1(x) + h(x) \Rightarrow$

$(p_1, h) = 1$, 即 $h \nmid p_1$, 取 $g(x) = p_1(x)$, 则 $(f, g) \neq 1$, 且 $\forall m, f | g^m$, 否则 $h = p_1^s(x)$, 矛盾.

" \Rightarrow " $f = p^r, \forall g(x)$, 若 $(p, g) = 1 \Rightarrow (p^r, g) = (f, g) = 1$, 若 $(p, g) \neq 1 \Rightarrow p | g \Rightarrow f | g^r(x)$

p48.8: $f(x)$ 首项系数 $= 1$, $\partial(f(x)) > 0$, 则 $f(x)$ 为某不可约多项式的方幂 \Leftrightarrow

$\forall g(x) | h(x)$, 由 $f | gh \Rightarrow f | g$ 或者 $\exists m, f(x) | h^m(x)$

证明 " \Rightarrow " 设 $f = p^r$, 若 $f | gh, (p, h) = 1 \Rightarrow (p^r, h) = 1 \Rightarrow (f, h) = 1 \Rightarrow f | g$

$$(p, h) \neq 1 \Rightarrow p | h \Rightarrow p^r | h^r \Rightarrow f | h^r(x)$$

" \Leftarrow " 反设不是, 则 $f = p_1^r h$, 而 $\partial(h) > 0$, $p_1 + h$, 令 $g = p_1^r, h = h(x)$, 则

$f | gh$ 却 $f + g, f + h^m, \forall m: (p, h) = 1 \Rightarrow (p^r, h^m) = 1$

P48, 补 9 证: $x^n + ax^{n-m} + b$ 没有重数 > 2 的非零根

证: 反设 $f(x) = x^n + ax^{n-m} + b$ 有 k 重根 α , ($k > 2, \alpha \neq 0$)

$g(x) = f'(x) = nx^{n-1} + a(n-m)x^{n-m-1}$ 有 k 重根 $\alpha \neq 0$

$$\Rightarrow nx^{n-m-1}(x^m + \frac{a(n-m)}{n}) \text{ 有重根 } \alpha \neq 0$$

$$\therefore h(x) = x^m + \frac{a(n-m)}{n} \text{ 有重根 } \alpha \neq 0$$

$$\text{但 } h'(x) = mx^{m-1} \quad \therefore (h(x) h'(x)) = \begin{cases} 1 & \text{无重数根} \\ h'(x) & \text{重根0} \end{cases}$$

P48、补 10

$0 \neq f(x) \in C[x]$, 且 $f(x) | f(x^n), n > 1$,

证明 $f(x)$ 的根只能为 0 或 单位根 (即满足某 $x^m = 1$ 的根).

证: 设 α 为 $f(x)$ 的根, 由 $f(x^n) = f(x)g(x)$

$\therefore f(\alpha^n) = 0, \alpha^n$ 为 $f(x)$ 的根,

$\therefore f(\alpha^{n^2}) = 0, \alpha^{n^2}$ 为 $f(x)$ 的根,

$\Rightarrow \alpha, \alpha^n, \alpha^{n^2}, \alpha^{n^3}, \dots$ 都为 $f(x)$ 的根.

$\because f(x) \neq 0, \therefore f(x)$ 不可能有无限个根, 其中必有相等者:

$$\alpha^{n^i} = \alpha^{n^j} \quad (\text{不妨设 } i > j),$$

$$\therefore \alpha^{n^2}(\alpha^{n^i-n^j}-1)=0, \text{令 } n^i-n^j=m.$$

则或 $\alpha=0$, 或 α 是 $x^m=1$ 的根.

P48、补 11 题:

$$\because f'(x) \mid f(x) \Rightarrow f(x) = a(x-b)^n \therefore f(x) \text{ 有 } n \text{ 重根} b.$$

补充 P48 12 题: $a_1, a_2 \dots a_n$ 的两两不同. $F(x) = (x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_n)$

证: (1)

$$\sum_{i=1}^n \frac{F(x)}{(f-a_i)F'(a_i)} = 1 \quad \because l_i = \frac{F(x)}{(x-a_i)F'(a_i)} = \frac{(x-a_1)(x-a_{i-1})(x-a_{i+1})\dots(x-a_n)}{(a_i-a_1)(a_i-a_{i-1})(a_2-a_{i+1})(a_i-a_n)}$$

$$l_i(a_j) = 0, l_i(a_i) = 1, \therefore \sum_{i=1}^n l_i(a_j) = 1, \forall j = 1 \dots n. \forall i, \sum_{i=1}^n l_i(x_i), i = 1 \dots n$$

为 $n-1$ 次多项式, $\therefore \sum_{i=1}^n l_i(x) = 1$, (2) 设 $f(x) = F(x)q(x) + r(x)$, 则 $f(a_i) = r(a_i)$,

$$\begin{aligned} \text{而 } n-1 \text{ 形式多项式} \sum_{r=1}^n f(a_i)l_i(x) &= h(x) : h(a_j) = f(a_j) \\ &= r(a_j) \quad \therefore h(x) = r(x) \end{aligned}$$

p49、补 13 题:

$$(1) \text{ 求 } f(x) \quad \partial(f(x)) < 4 \text{ 且 } f(2) = 3 \quad f(3) = -1 \quad f(4) = 0 \quad f(5) = 2$$

$$l_1(x) = \frac{(x-3)(x-4)(x-5)}{(2-3)(2-4)(2-5)} = -\frac{1}{6}(x^3 - 12x^2 + 47x - 60)$$

$$l_2(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-5)}{(3-2)(3-4)(3-5)} = \frac{1}{2}x^3 - \frac{11}{2}x^2 + 19x - 20$$

$$l_3(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-5)}{(4-2)(4-3)(4-5)} = \frac{1}{2}x^3 + 5x^2 + \frac{31}{2}x + 15$$

$$l_4(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(5-2)(5-3)(5-4)} = \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{13}{3}x - 4$$

$$\therefore f(x) = \sum_{i=1}^4 (l_i(x))f(a_i) = 3l_1 - l_2 + 0 \cdot l_3 + 2l_4 = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{17}{2}x^2 - \frac{203}{6}x + 42$$

②求一个二次多项式 $f(x)$, $f(0) = \sin 0, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2}, f(\pi) = \sin \pi = 0$.

$$l_1(x) = \dots,$$

$$l_2 = \frac{(x-0)(x-\pi)}{\left(\frac{\pi}{2}-0\right)\left(\frac{\pi}{2}-\pi\right)},$$

$$l_3 = \dots,$$

$$\therefore f(x) = f\left(\frac{n}{2}\right)l_2 = \frac{x(x-\pi)}{-\frac{\pi^2}{4}}$$

③ $f(x)$ 可能低次项: $f(0) = 1 \quad f(1) = 2 \quad f(2) = 5 \quad f(3) = 10$

$$l_1(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - \frac{11}{6}x + 1$$

$$l_2(x) = \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)} = \frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x$$

$$l_3(x) = \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} = -\frac{x^3}{2} + 2x^2 + 3x$$

$$l_4(x) = \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(3-0)(3-1)(3-2)} = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x$$

$$\therefore f(x) = l_1(x) + 2l_2(x) + 5l_3(x) + 10l_4(x) = x^2 + 1$$

P49. 补 14), $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $f(0), f(1)$ 奇, 则 $f(x)$ 无整数根.

证: 反设 $f(x)$ 有整数数根 m , 则 $x-m \mid f(x)$,

$f(0)$ 奇 $\Rightarrow -m$ 奇 $f(1)$ 奇 $\Rightarrow 1-m$ 奇 矛盾!

第二章 行列式习题解答

P96.1 ① $\tau(134782695) = 0+1+1+3+3+0+1+1=10 \therefore 13478695$ 偶排列

② $\tau(217986354) = 1+0+4+5+4+3+0+1=18 \therefore 21798354$ 偶排列

③ $\tau(98765432) = 8+7+6+\cdots+1+2+1=36 \therefore 987654321$ 偶排列

P96.2 ① 若 $1274i56k9$ 偶则 $i, k=3, 8$ 或 $8, 3$

$$\tau(127435689)=5, \quad \tau(127485639)=10 \quad \therefore i=8, \quad k=3$$

②若 $1i25j4897$ 奇则 $i, k=3, 6$ 或 $6, 3$

$$\tau(132564897)=4 \quad \tau(162534897)=7 \quad \therefore i=6 \quad k=3$$

P96.3 $3\ 1\ 2\ 4\ 3\ 5 \rightarrow 2\ 1\ 4\ 3\ 5 \rightarrow 2\ 5\ 4\ 3\ 1 \rightarrow 2\ 5\ 3\ 4\ 1$ 即得

$$P96.4 \because \tau(n(n-1), \dots, 3\ 2\ 1) = C^n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

\therefore 当 $4|n$ 或 $4|n-1$ 即 $n=4k$ 或 $n=4k+1$ 时, C_n^2 为偶数, 偶排列。

当 $n=4n+2, n=4n+3$, 则 C_n^2 为奇数, 是奇排列

P96.5 排列 $\pi_1: x_1x_2\dots x_n$ 与 $\pi_2: x_nx_{n-1}\dots x_2x_1$ 中, 任取两个数 x_i, x_j

若 x_i, x_j 在 π_1 中有逆序, 则在 π_2 中没有, 反之在 π_1 中没有逆序, 则 π_2 中有逆序, $\therefore \tau(\pi_1) +$

$$\tau(\pi_2) = C_n^2$$

$$\text{即 } \tau(x_nx_{n-1}\dots x_2x_1) = C_n^2 - \tau(x_1x_2\dots x_n).$$

P97.6. 由于 $\tau(234516) + \tau(312645) = 8.a_{23}a_{31}a_{42} + a_{56}a_{14}a_{65}$ 带正号

由 $\tau(341562) + \tau(234165) = 10 \therefore a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{66}a_{23}$ 带正号

P96.7 $j_1j_2j_3j_4$ 由于 $j_2=3$, $\therefore j_1j_3j_4$ 取 1、2、4 的排列

$$j_1j_3j_4=124$$

$$\Rightarrow \tau(1324)=1, j_1j_3j_4 \Rightarrow \tau(1342)=2; j_1j_3j_4=214 \Rightarrow \tau(2314)=2$$

$$j_1j_3j_4=241 \Rightarrow \tau(2341)=3. j_1j_3j_4=142 \Rightarrow \tau(1342)=2; j_1j_3j_4=214 \Rightarrow \tau(2314)=2$$

$$j_1j_3j_4=241 \Rightarrow \tau(2341)=3, j_1j_3j_4=412 \Rightarrow \tau(4312)=5; j_1j_3j_4=421 \Rightarrow \tau(4321)=6$$

\therefore 取负号只有 $-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}, -a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}, -a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$

$$P97.8(1)D=(-1)^{\tau(n-321)}123\dots(n-1)n=(-1)\frac{n(n-1)}{2}\cdot n$$

$$P97.8(2)D=(-1)^{\tau(23\dots n1)}123\dots n=(-1)^{n-1}\cdot n$$

$$P97.8(3)D=(-1)^{\tau((n-1)-(n-2)\dots 21n)}123\dots n=(-1)\frac{(n-1)(n-2)}{2}\cdot n$$

$$P97.9D=\sum_{j_1j_2j_3j_4j_5}(-1)^{(j_1j_2j_3j_4j_5)}aj_1bj_2cj_3dj_4ej_5$$

因后三行后三列为 0, 所以非零的项只有, $j_3 \leq 2, j_4 \leq 2, j_5 \leq 2$, 而 j_3, j_4, j_5 是互不相

同的数, 这是不可能的, 所以没有非 0 的项, D=0

$$P97.10 \quad f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} \text{求 } x^4, x^3 \text{ 的系数}$$

解: \because 行列式中每项由每行出一元相乘, 故 x^4 必须将 2. 3. 4 行的 x 都取, 这时第 i 行取第 i 列, 这是行列式的一项, ax^4 , 系数为 $a=2$ 。

x^3 项必有一元 a_{ij} 在对角线外, 于是 i 行, j 列的 x 不能再取了, 故当 $i=1, j>2$ 时, 至少去掉 3 个 x, 不含 x^3 项了, 对于 $i>2, j=2$ 同理

其它情形, 至少去掉两个 x 且第一行 (或第二列) 的两个 x 只能取一个, 故不含 x^3 项, 只剩下 $i=1, j=2$ 时, a_{12} 本身是 x 项为

$$(-1)^{(2134)} a_{12} a_{21} a_{33} a_{44} = -x^1 x x = -x^3, \text{ 系数为 } -1$$

$$P97.11 \quad d = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} \cdot 1 = 0 \quad \text{故 } \sum \text{ 中 } +1 \text{ 与 } -1 \text{ 一样多, 即 } +\text{ 号, } -\text{ 号一样多,}$$

也即奇偶排列一样多, $\therefore n \geq 2$ 时, 奇偶排列各占一半.

$$P98.12 \quad p(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = V x^{n-1} + \cdots \text{ (按第一行展开)}$$

$\because a_1 a_2, \dots, a_{n-1}$ 两两不同 $\therefore V_{n-1} \neq 0$ 即 $\partial(p(x)) = n-1$

$\therefore p(a_1) = p(a_2) = \cdots = p(a_{n-1}) = 0$ (总有两行相同) 最多 $n-1$ 个根,

② 即 $p(x)$ 的所有根为 a_1, a_2, \dots, a_{n-1}

$$P98.13 \quad ② \quad \xrightarrow[2x(1)+3]{1x(1)+3} \begin{vmatrix} x & x & x+y \\ y & x+y & x \\ 2(x+y) & 2(x+y) & 2(x+y) \end{vmatrix} \xrightarrow{3(2(x+y))^{-1}} 2(x+y)$$

$$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[3(-x)+2]{3(-x-y)+1} 2(x+y) \begin{vmatrix} -y & -x & 0 \\ y-x & y & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(x+y)[-y^2 + xy - x^2] = -2(x^3 + y^3)$$

$$P48.13③ \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{P2.23.3.4(\text{例})} (3 + (4-1) \cdot 1)(3-1)^{4-1} = 6 \cdot 2^3 = 48$$

P98.13④ (法一) :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & -8 & -10 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 36 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{vmatrix} = 160$$

法二:

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 & 4 \\ 10 & 3 & 4 & 7 \\ 10 & 4 & 1 & 2 \\ 10 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 20 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 20 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-20) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 160 \end{aligned}$$

法三:

$$f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 \quad \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4 \text{ 为4次单位根 } \pm 1, \pm i$$

令 $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = -1, \varepsilon_3 = i, \varepsilon_4 = -i$, 则

$$\begin{aligned} \text{行列式 } d &= (-1)^{\frac{3}{4-1}} f(1)f(-1)f(i)f(-i) \\ &= (-1)^3 \cdot 10 \cdot (-2) \cdot (-2-2i) \cdot (-2+2i) = 20[(-2)^2 - (2i)^2] = 160 \end{aligned}$$

令

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & x & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -x & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & y & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix} = x^2 y^2$$

P98.13⑤解:

$$\text{解法二, 设 } f(x, y) = \begin{vmatrix} 1+x & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \text{ 则第一行减第二行} \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ * & & & \end{vmatrix}$$

$$\therefore x | f(x, y)$$

$$\text{又因为 } f(-x, y) = \begin{vmatrix} 1-x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{交换1,2行} \\ \text{再交换1,2列}}} \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = f(x, y).$$

$\therefore f(x, y)$ 关于 x 是偶函数, 即 $x^2 | f(x, y)$.

同理, $y | f(x, y)$, 且也是偶函数, 所以 $y^2 | f(x, y)$

$$\because \partial(f(x, y)) \leq 4 \quad \therefore x^2 y^2 | f(x, y) \Rightarrow f(x, y) = kx^2 y^2$$

而 $f(x, y)$ 中 $x^2 y^2$ 的系数为 1. 故有 $f(x, y) = x^2 y^2$.

P98 13⑥

$$\xrightarrow{\substack{1 \times (-1)+2 \\ 1 \times (-1)+3 \\ 1 \times (-1)+4}} \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 & 6a+9 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 & 6b+9 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 & 6c+9 \\ d^2 & 2d+1 & 4d+4 & 6d+9 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{2 \times (-2)+3 \\ 2 \times (-3)+4}} \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 & 6 \\ b^2 & 2b+1 & 2 & 6 \\ c^2 & 2c+1 & 2 & 6 \\ d^2 & 2d+1 & 2 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质5}} 0$$

$$\xrightarrow{\substack{2 \times (-1)+3}} \begin{vmatrix} 246 & 427 & -100 \\ 1014 & 543 & -100 \\ -342 & 721 & -100 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{3 \times (246)+1 \\ 3 \times (427)+2}} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 768 & 116 & 1 \times (-100) \\ -588 & 294 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{2 \times (2)+1}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1000 & 116 & 1 \times (-100) \\ 0 & 294 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质7}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 116 & 1000 \\ 1 & 294 & 0 \end{vmatrix} \times (100) = -100 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 294 & 0 \\ 1 & 116 & 1000 \end{vmatrix} = -29400000$$

$$P98.14 \text{ 左} \xrightarrow{\substack{2 \times (1)+1 \\ 3 \times (1)+1 \\ 1 \times (\frac{1}{2})}} 2 \begin{vmatrix} a+b+c & c+a & a+b \\ a_1+b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ a_2+b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{1 \times (-1)+2 \\ 1 \times (-1)+3}} 2 \begin{vmatrix} a+b+c & -b & -c \\ a_1+b_1+c_1 & -b_1 & -c_1 \\ a_2+b_2+c_2 & -b_2 & -c_2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{2 \times (1)+1 \\ 2 \times (1)+1}} 2 \begin{vmatrix} a & -b & -c \\ a_1 & -b_1 & -c_1 \\ a_2 & -b_2 & -c_2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{2(-1) \\ 3(-1)}} \text{右} (-1)^2 = \text{右}$$

P98.15 求出所有代数余子式

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \text{直接计算有 } \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 & 0 \\ -12 & 6 & 0 & 0 \\ 15 & -6 & -3 & 0 \\ 7 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \text{直接计算有 } \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 3 \\ 6 & 4 & -1 \\ -5 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

P99.16①

$$= \begin{vmatrix} -1 & +3 & +5 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} \begin{array}{l} |1 \times (2) + 2| \\ |1 \times (3) = 4| \\ |1 \times (2) + 5| \\ \hline \end{array} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 11 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 12 & 16 & 5 & 7 \\ 0 & 7 & 10 & 5 & 9 \end{vmatrix} \begin{array}{l} |2(-3)| \\ |2(-1)| \\ \hline \end{array} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 11 & 4 & 5 \\ 0 & 12 & 16 & 5 & 7 \\ 0 & 7 & 10 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} |2 \times (6) + 3| \\ |2 \times (2) + 4| \\ |2 \times (7) + 5| \\ \hline \end{array} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & -8 & 17 & -41 \\ 0 & 0 & -4 & 12 & -19 \end{vmatrix} \begin{array}{l} |3(-1)| \\ |3 \times (8) + 4| \\ |3 \times (4) + 5| \\ \hline \end{array} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & -8 & 63 & 111 \\ 0 & 0 & 0 & -28 & 57 \end{vmatrix} \begin{array}{l} |4 \times (-2) + 3| \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & -10 & 19 \\ 0 & 0 & 0 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -28 & 57 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} |1 \times (-1)| \\ |2 \times (-1)| \\ |4 \times (-4) + 5| \\ \hline \end{array} \begin{vmatrix} 1 & - & -5 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -10 & 19 \\ 0 & 0 & 0 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 69 \end{vmatrix} = (-7)69 = -483$$

P99.16②

$$\begin{array}{l}
 \left| \begin{array}{ccccc} 2 & 1 & 0 & 4 & -2 \\ 2 & 0 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right| \xrightarrow{1 \rightarrow 4} \left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 5 & 1 & -5 & -6 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 6 & 6 & -8 & -7 \end{array} \right| \\
 \hline \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 5 & 1 & -5 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 6 & 6 & -8 & -7 \end{array} \right| \\
 \hline \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -15 & -14 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -20 & 17 \end{array} \right| \xrightarrow{4 \rightarrow 3} \left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 \times \frac{1}{3} & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 3 \times (-4) + 4 & 0 & 0 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{7} \end{array} \right| \\
 \hline \hline
 \end{array}$$

$$= -\frac{3}{8} \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 7 \cdot \left(\frac{1}{7}\right) = \frac{3}{8}$$

P99.17①若

$j_1 j_2 \cdots j_n$ 中 $j_n = n$, 则 j_{n-1} , 取 j_{n-1} 取 $n-1$, j_{n-2} 取 $n-2 \cdots$, $j_2 = 2$, $j_1 = 1$ 或若 $j_n = 1$, 则
 $\Rightarrow j_1 = 2$, $j_2 = 3, \cdots j_{n-1} = n$. 故只有两项. $\tau(123 \cdots n) = 0$, $\tau(2, 3, \cdots n1) = n-1$

$$\therefore d = \sum x^n + (-1)^{n-1} y^n$$

P99.17②

$$n=1 \text{ 则 } d = a_1 - b_1$$

$$\begin{aligned}
 n=2, \text{ 则 } d &= (a_1 - b_1)(a_2 - b_2) - (a_1 - b_2)(a_2 - b_1) \\
 &= a_1 b_1 - a_2 b_2 + a_1 b_1 - b_2 a_2 \\
 &= (a_2 - a_1)(b_2 - b_1)
 \end{aligned}$$

$$\text{当 } n \geq 3 \text{ 时} \quad \left| \begin{array}{ccc} a_1 - b_1 & b_1 - b_2 & \vdots & a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 & b_1 - b_2 & \vdots & b_1 - b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & b_1 - b_n \\ a_n - b_1 & b_1 - b_n & \vdots & b_1 - b_n \end{array} \right| = 0 \text{ 第2列与第 } n \text{ 列成比例}$$

$$P99.17 \textcircled{3} \xrightarrow[2\times(1)+1 \\ 3\times(1)+1 \\ n\times(1)+1]{\quad} \left| \begin{array}{cccc|c} \sum_{i=1}^m x_i - m & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & x_2 - m & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & x_n \\ \sum_{i=1}^m x_i - m & x_2 & \cdots & x_{n-m} \end{array} \right| \xrightarrow{\substack{1(\sum_{j=1}^n (x_{j-m})^{-1}) \\ 1\times(-x_2)+2 \\ 1\times(-x_3)+3 \\ 1\times(-x_n)+n}} \left| \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -m & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & -m \end{array} \right|$$

$$\left(\sum_{i=1}^h X_i - m \right) = \left(\sum_{i=1}^h X_i - m \right) (-m)^{n-1} = (-1)^n (m - \sum_{i=1}^h X_i) m^{n-1}.$$

$$P99.17 \textcircled{4} \xrightarrow[2\times(i-4)+4]{\quad} \left| \begin{array}{ccccc|ccccc} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & & & 2 & \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & n-2 & & & & n-2 \end{array} \right| \xrightarrow[\substack{1\leftrightarrow 2 \\ 1\leftrightarrow 2}]{\text{性质}} \left| \begin{array}{ccccc|ccccc} 2 & 2 & \cdots & 2 & & & & & \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & & & & & & & & \\ 0 & & & & & & & & \end{array} \right|$$

$$\xleftarrow[1\leftrightarrow 2]{1(\frac{1}{2})} \left| \begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & & & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & & & & \\ 0 & & & & & & & & \\ 0 & 0 & n-2 & & & & & & \end{array} \right|$$

$$= -2 \cdot (n-2)! \quad (n \geq 2), \text{ 且 } n=1 \text{ 时。} D=1 \text{ (左上角 1)}$$

P99.17.5 从最后一列开始, 第n列加到第n-1列, 再第n-1列加到第n-2列..., 第2列加

$$= \left| \begin{array}{ccccc|ccccc} \frac{n(n+1)}{2} & \frac{n(n+1)}{2} & \frac{n(n-1)}{2}-3 & \cdots & 2n-1-n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-n \end{array} \right|$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)(-2) \cdots (1-n) = (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{2} \cdot (n+1)!$$

P100.18①: 从第二列起: 有列 (第三列)

$-\frac{1}{a_{i-1}}$ 加到第一列, 则有
乘以 a_{i-1}

$$\begin{aligned}
D &= \begin{vmatrix} a_o \sum_{i=2}^{n+1} \frac{1}{a_{i-1}} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & a_n & \end{vmatrix} \\
&= a_1 a_2 \cdots a_n (a_o - \sum_{i=2}^{n+1} \frac{1}{a_{i-1}}) = a_1 a_2 \cdots a_n (a_o - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}) \\
&= a_o a_1 \cdots a_n + \sum_{i=1}^n a_1 \cdots a_{i-1} a_{i+1} \cdots a_n, \quad (\alpha_i \neq 0) \quad \textcircled{2}
\end{aligned}$$

P100.18④

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos a & 1 & & & \\ 1 & 2 \cos a & 1 & & \\ & 1 & 2 \cos a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2 \cos a \end{vmatrix} = \cos n\alpha$$

证法一，用归纳法， D_1 成立，

设 $k < n$ 时 $D_k = \cos k\alpha$, 当 $k = n$ 时, 因为

$$\begin{aligned}
D_n &= \cos 2\alpha D_{n-1} - 1 \cdot D_{n-2} = (2 \cos \alpha \cdot \cos(n-1)\alpha - \cos(n-2)\alpha) = (\cos na + \cos(n-2a - \cos(n-2)a)) \\
&= \cos na. \text{ 证毕}
\end{aligned}$$

证法二：

$$\because D_n = 2 \cos cx D_{n-1} - D_{n-2} \quad \text{找不出适当倍数左移.} (i^2 = -1),$$

$$D_n - (\cos \alpha + i \sin \alpha) D_{n-1} = (\cos \alpha - i \sin \alpha) [D_{n-1} - (\cos \alpha + i \sin \alpha) D_{n-2}]$$

$$\text{同理 } D_n = (\cos a - i \sin a) D_{n-1} = (\cos(n-1)a + i \sin(n-1)a)(i \sin a)$$

$$\text{相减: } 2i \sin a D_n = i \sin a [\cos na + \sin na + \cos na - \sin na]$$

$$\text{即 } D_n = \frac{1}{2} (2 \cos na) = \cos na$$

P100.18⑤以第一行 $\times (-1)$ 加到后面各行

$$= \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & 0 & 0 \\ -a_n & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}$$

$$(属于交行列式) = a_1 \cdots a_n (1 + a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{-a_i}{a_2})$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_1} + 1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} \right)$$

$$\text{要求 } (a_i \neq 0) \quad = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} \right)$$

p101.19①

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 & 2 \\ 3 & -3 & 3 & 2 \\ 3 & -3 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & -6 & -4 \\ 1 & 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -6 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -18 - 52 = -70$$

$$\text{且 } D_1 = D_2 = D_3 = D_4 = -70 \quad \therefore \quad x_i = \frac{D_i}{D} = 1, i = 1, 2, 3, 4$$

P101, 19②

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & -8 & 1 \\ 0 & -4 & -10 & 8 \\ 0 & -7 & -4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 8 & 1 \\ 4 & 10 & 8 \\ 7 & 4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -36 & -54 & 8 \\ -18 & -36 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 36 & 54 \\ 18 & 36 \end{vmatrix}$$

$$\text{且 } D_1 = 324, \quad D_2 = 648, \quad D_3 = -324, \quad D_4 = -648, \quad = 18^2 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 18^2 = 324$$

$$\therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = 1, x_2 = \frac{D_2}{D} = 2, x_3 = -1, x_4 = -2$$

$$\text{P101 19 (3), 即 } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & -4 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 4 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & -8 & 8 \\ 0 & 4 & 2 & -4 & 8 \\ 0 & 7 & 8 & -6 & -14 \\ 1 & -1 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -16 & 26 & -22 \\ 1 & 5 & -8 & 8 \\ 0 & -18 & 38 & -24 \\ 0 & -27 & 50 & -42 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -18 & 28 & -24 \\ -9 & 22 & -18 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 10 & 28 & 4 \\ 13 & 22 & 4 \end{vmatrix} = -(-2) \cdot (x-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 10 & 4 \\ 13 & 4 \end{vmatrix} = -8 \begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 13 & 1 \end{vmatrix} = 24$$

同理算出 $d_1 = 96, d_2 = -336, d_3 = -96, d_4 = 169, d_5 = 312$

即得 $x_1 = -4, x_2 = -14, x_3 = -4, x_4 = 7, x_5 = 13$

(消元法解)

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & -2 & 4 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & -4 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 4 & 2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & -1 & 2 & -3 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{5\text{行移最上} \\ \text{再相减}}} \left(\begin{array}{ccccccc} 1 & -1 & -1 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & -8 & 8 & 14 \\ 0 & 4 & 2 & -4 & 8 & 12 \\ 1 & 7 & 8 & -6 & 14 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{3\text{行移到第2行再相减}}}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 4 & -6 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 5 & -8 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -16 & 26 & -22 & -40 \\ 0 & 0 & -18 & 28 & -24 & -44 \\ 0 & 0 & -27 & 50 & 42 & -88 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(3)-(4)\text{后再乘}\frac{1}{2} \\ (5)\times(4)\text{的2倍}}}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 4 & -6 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 5 & -8 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -18 & 28 & -24 & -44 \\ 0 & 0 & 9 & -6 & 6 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(4)+(5)\text{的2倍后乘以}\frac{1}{4}\text{再用3行的相反倍加到各行}}}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(5)\times\frac{1}{3}\text{后再乘相应倍加到各行}}}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -6 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{(1)+(4) \\ (5)+(4)\text{后再交换}(4), (5)}} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 13 \end{array} \right)$$

即得.

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 15 \end{vmatrix} = \frac{2^6 - 3^6}{2 - 3} = 3^6 - 2^6 = 665$$

见例2,

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & & & \\ 1 & \alpha + \beta & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{\alpha - \beta}$$

取 $\alpha = 2, \beta = 3$

$$\text{且, } D_1 = 1507, D_2 = -1145, D_3 = 703, D_4 = -395, D_5 = 212$$

$$\therefore x_1 = \frac{1507}{665}, x_2 = \frac{-229}{133}, x_3 = \frac{37}{35}, x_4 = -\frac{79}{133}, x_5 = \frac{212}{665}$$

P101.20 解:

$$\begin{cases} c_0 a_1^{n-1} + c_1 a_1^{n-2} + \cdots + c_{n-1} = b_1 \\ c_0 a_2^{n-1} + c_1 a_2^{n-2} + \cdots + c_{n-1} = b_2 \\ c_0 a_n^{n-1} + c_1 a_n^{n-2} + \cdots + c_{n-1} = b_n \end{cases}$$

代入各a于f(x)

系数行列式:

$$d = \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2} \cdots a_1 & 1 \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2} \cdots a_2 & 1 \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2} \cdots a_n & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \cdots a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 \cdots a_n^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 \cdots a_n^{n-1} \end{vmatrix} = (-1) C_n^2 V_n$$

由于 $a_1, a_2 \cdots a_n$ 两两不同, 故 $V_n' \neq 0, d \neq 0$ 由Cramer法则, 存在

唯一解 $c_0, c_1, c_2 \cdots c_{n-1}$, 即有 $f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} C_i x^{n-1-i}$ (唯一地) 使 $f(a_i) = b_i$

$$\begin{cases} a_0 = 13.60 \\ a_0 + 10a_1 + 100a_2 + 1000a_3 = 13.57 \\ a_0 + 20a_1 + 400a_2 + 8000a_3 = 13.55 \\ a_0 + 30a_1 + 900a_2 + 7000a_3 = 13.52 \end{cases}$$

例P101.21 解:

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 10 & 10^2 & 10^3 \\ 1 & 20 & 20^2 & 20^3 \\ 1 & 30 & 30^2 & 30^3 \end{vmatrix} = 1.2 \times 10^7$$

$$= (1, 10, 20, 30) \cdot (20-10) \cdot (30-10) \cdot (30-20)$$

$$d_0 = 1.632 \times 10^8, d_1 = -50000, d_2 = 1800, d_3 = -40$$

$$a_0 = \frac{d_0}{d} = 13.6, a_1 = -\frac{25}{6} \times 10^{-3}, a_2 = 1.5 \times 10^{-4}, a_3 = -\frac{1}{3} \times 10^{-5}$$

用消元法:

$$\begin{array}{cc} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 13.6 \\ 1 & 10 & 100 & 1000 & 13.57 \\ 1 & 20 & 400 & 8000 & 13.55 \\ 1 & 30 & 900 & 27000 & 13.52 \end{array} \right) & \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 13.6 \\ 0 & 10^3 & 10^4 & 10^5 & -3 \\ 0 & 2 \times 10^3 & 4 \times 10^4 & 5 \times 10^5 & -5 \\ 0 & 3 \times 10^3 & 9 \times 10^4 & 27 \times 10^5 & -8 \end{array} \right) \end{array}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 13.6 \\ 0 & 10^3 & 10^4 & 10^5 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \times 10^4 & 6 \times 10^5 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \times 10^4 & 24 \times 10^5 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 13.6 \\ 0 & 10^3 & 10^4 & 10^5 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \times 10^4 & 6 \times 10^5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \times 10^5 & -2 \end{array} \right) \rightarrow (\text{略})$$

$$h = 13.6 - \frac{25}{6} \times 10^{-3} \times t + \frac{3}{2} \times 10^{-4} \times t^2 - \frac{1}{3} \times 10.5 \times t^3 (t = {}^\circ C, h = \frac{g}{cm^3})$$

故当 $t=15 {}^\circ C$ 时, $h=13.56$ (精确) $(\frac{g}{cm^3})$

当 $t=40 {}^\circ C$ 时, $h=13.46$ (书上答案 13.48 是错的)

P102 补 1

$$D_1 = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix} \quad \text{设 } D = |a_{ij}|$$

$$\therefore D_1 = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} D = \left(\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 取遍}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \right) D = 0$$

$(n \geq 2$ 奇偶排列各半)

当 $n=1$ 时,

$$P102 \text{ 补} 2 \because D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1}(t) a_{2j_2}(t) \cdots a_{nj_n}(t)$$

$$\therefore \frac{d}{dt} D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} (\sum_{k=1}^n a_{1j_1}(t) \cdots a_{k-1j_{k-1}}(t) \frac{da_{kj_k}(t)}{dt} a_{k+1j_{k+1}} \cdots a_{nj_n}(t))$$

$$= \sum_{k=1}^n (\sum_{j_1, j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1}(t) a_{2j_2}(t) \cdots a_{k-1j_{k-1}}(t) \frac{da_{kj_k}(t)}{dt} a_{k+1j_{k+1}} \cdots a_{nj_n}(t))$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & a_{1n}(t) \\ \frac{d}{dt} a_{11}(t) & \frac{d}{dt} a_{12}(t) & \frac{d}{dt} a_{1n}(t) \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

$$\text{同理也有 } \frac{d}{dt} D = \frac{d}{dt} \sum_{n=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{21}(t) & a_{n1}(t) \\ \frac{d}{dt} (a_{1k}(t)) & \frac{d}{dt} a_{2k}(t) & \frac{d}{dt} a_{nk}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

$$(转置) = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} a_{11} & \frac{d}{dt} a_{1k}(t) & a_{1n} \\ a_{21} & \frac{d}{dt} a_{2k}(t) & a_{2n} \\ a_{n1} & \frac{d}{dt} a_{nk}(t) & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\text{左} = \begin{vmatrix} a_{11}^{+x} & a_{12}^{+x} & \cdots & a_{1n}^{+x} \\ a_{21}^{+x} & a_{22}^{+x} & \cdots & a_{2n}^{+x} \\ a_{n1}^{+x} & a_{n2}^{+x} & \cdots & a_{n3}^{+x} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_{11}^{+x} & a_{12}^{+x} & \cdots & a_{1n}^{+x} \\ 1 & a_{21}^{+x} & a_{22}^{+x} & \cdots & a_{2n}^{+x} \\ 1 & a_{n1}^{+x} & a_{n2}^{+x} & \cdots & a_{n3}^{+x} \end{vmatrix}$$

P102 补 3 ①

$$= \begin{vmatrix} 1 & -x & -x \cdots -x \\ 1 & a_{11} & a_{12} \cdots a_{12} \\ 1 & a_{21} & a_{22} \cdots a_{2n} \\ 1 & a_{n1} & a_{n2} \cdots a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} \cdots a_{1n} \\ a_{n1} \cdots a_{nn} \end{vmatrix} + (-x) \sum_{i=1}^n (-1)^{1+(j+1)} \begin{vmatrix} 1 & a_{11} \cdots a_{1j-1} & a_{1j+1} \cdots a_{1n} \\ \vdots & & \\ 1 & a_{n1} \cdots a_{nj-1} & a_{nj+1} \cdots a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= D + X \sum_{i=1}^n (-1)^{j+1} \begin{vmatrix} a_{11} \cdots a_{1j-1} & a_{1j+1} \cdots a_{1n} \\ a_{21} \cdots a_{2j-1} & a_{2j+1} \cdots a_{2n} \\ a_{n1} \cdots a_{nj-1} & a_{nj+1} \cdots a_{nn} \end{vmatrix} (-1)^{j-1} \\
&= D + X \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n 1 \cdot A_{ij} \right) = D + X \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}
\end{aligned}$$

补 3 ②在①中令 $X=1$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} + 1 & a_{12} + 1 & \cdots & a_{1n} + 1 \\ a_{21} + 1 & a_{22} + 1 & \cdots & a_{2n} + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + 1 & a_{n2} + 1 & \cdots & a_{nn} + 1 \end{vmatrix} - D =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1n-1} - a_{1n} & a_{1n} + 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2n-1} - a_{2n} & a_{2n} + 1 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{nn-1} - a_{nn} & a_{nn} + 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1n-1} - a_{1n} & a_{1n} \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2n-1} - a_{2n} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{nn-1} - a_{nn} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

P103 补 4②: 以第一行 $\times (-\alpha)$ 加到后面各行

$$\begin{vmatrix} \lambda & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ b - \frac{\beta\lambda}{\alpha} & \alpha - \beta & 0 & 0 & 0 \\ b - \frac{\beta\lambda}{\alpha} & 0 & \alpha - \beta & 0 & 0 \\ b - \frac{\beta\lambda}{\alpha} & 0 & 0 & 0 & \alpha - \beta \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= (\alpha - \beta)^{n-1} \left(\lambda - \sum_{i=2}^n \frac{\alpha b - \beta \lambda}{\alpha - \beta} \right) \\
&= \lambda(\alpha - \beta)^{n-1} - (n-1)(\alpha b - \beta \lambda)(\alpha - \beta)^{n-2}
\end{aligned}$$

P103 补 4、③ 见上面 4④得

$$D^n = [a(x+a)^n + a(x-a)^n]/2a = \frac{1}{2}[(x+a)^n + (x-a)^n]$$

P103 补 4④

$$D_n = \begin{vmatrix} & & y \\ * & & y \\ & \vdots & * \\ z z \cdots z & x-y+y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & y \\ * & & y \\ & \vdots & * \\ oo & \cdots o & x-y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & \cdots & \cdots & y \\ z & z & \cdots & \cdots & x & y \\ z & z & \cdots & \cdots & z & y \end{vmatrix}$$

$$= (x-y)D_{n-1} + \begin{vmatrix} x-z & y-x & o & \cdots & o \\ o & x-z & y-x & \cdots o \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ o \cdots & & x-z & o \\ z \cdots & \cdots & z & y \end{vmatrix} = (x-y)D_{n-1} + y(x-z)^{n-1} \quad (i)$$

y与z的对称位置有 $D_n = (x-z)D_{n-1} + z(x-y)^{n-1}$ (ii)

(1) $\times (x-z) - (ii) \times (x-y)$: 得 $(y-z)D_n = y(x-z)^n - z(x-y)^n$

$$\therefore D_n = [y(x-z)^n - z(x-y)^n] / (y-z)$$

由令, $y=a$, $z=-a$, 便得

P103, 补 5, $f(x)$ 是一个 $n+1$ 级行列式

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots 0 & x \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots 0 & x^3 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots 0 & x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & n & c_n^2 & c_n^3 & \cdots c_n^{n-1} & x_n \\ 1 & n+1 & c_{n+1}^2 & c_{n+1}^3 & \cdots c_{n+1}^{n-1} & x^{n-1} \end{vmatrix}$$

计算 $f(x+1)$, 由于前 n 列完全一样, 故以下只标出第 $n+1$ 列

$$f(x+1) = \begin{vmatrix} * & x+1 & & & & \\ * & (x+1)^2 & & & & \\ * & (x+1)_3 & & & & \\ \cdots & \cdots & & & & \\ * & (x+1)^n & & & & \\ * & (x+1)^{n+1} & & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & x+1 & & & & \\ * & x^2 + 2x + 1 & & & & \\ * & x^3 + 3x^2 + 3x + 1 & & & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & & & \\ * & x^n + C_n^{n-1} x^{n-1} + \cdots + C_n^1 x + 1 & & & & \\ * & x^{n+1} + (n+1)x^n + \cdots + C_n^2 x^2 + (n+1)x + 1 & & & & \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ x^2 & 0 & 0 & 2x & 2x & 1 \\ *x^3 & *0 & 0 & 3x & 3x & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x^n & 0 & *0 & (n-1)x & (n-1)x & 1 \\ x^{n+1} & 0 & c_n^2 x^{n-1} & nx & nx & 1 \\ & (n+1)x^n & c_{n+1}^2 x^{n-2} & (n+1)x & (n+1)x & 1 \end{vmatrix}$$

其余首项 (可算出后面每个行列式的最后一列都与前面某列比例=0)

$$= f(x) + (\text{第2个行列式}) D_2$$

$$\text{而 } D_2 = \begin{vmatrix} 1 & & & \\ 2 & & & \\ 3 & & & \\ * & \ddots & c_n^{n-1} & (n+1)x^n \end{vmatrix} = (n+1)! x^n$$

$$\therefore f(x+1) - f(x) = (n+1)!x^n$$

P104 补 6 分别用 U、X、Y、Z 表示该些点的电位

$$\left\{ \begin{array}{l}
 (x-y) \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{x}{1}} + (x-0) \cancel{\frac{1}{1}} = 100 \\
 (y-x) \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{x}{1}} + (y-z) \cancel{\frac{1}{3}} = 100 \\
 (x-y) \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{x}{1}} + (x-0) \cancel{\frac{1}{1}} = 100 \\
 (o-z) \cancel{\frac{1}{4}} + \cancel{\frac{u}{1}} + (v-x) \cancel{\frac{1}{1}} = 100
 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l}
 ax - 2y - v = 100 \\
 -2x + 12y - 3z = 100 \\
 -3y + 15z - 4u = 100 \\
 -x - 4z + 10v = 100
 \end{array} \right.$$

$$D = \begin{vmatrix} a & -2 & 0 & -1 \\ -2 & 12 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 15 & 14 \\ -1 & 0 & -4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -4 & 10 \\ 0 & 12 & 5 & -20 \\ 0 & -3 & 15 & -4 \\ 0 & -2 & -36 & 89 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 65 & -36 \\ -1 & +51 & -93 \\ 0 & -138 & 275 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 65 & -36 \\ 138 & 275 \\ 17875 - 4968 \end{vmatrix}$$

$$dx = 210100, dy = 188400, dz = 183300, do = 223400. \quad = 12907$$

$$\therefore x = \frac{210100}{12907}, y = \frac{188400}{12907}, z = \frac{183300}{12907}, v = \frac{223400}{12907}$$

P154,T1

1)解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & -4 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & -4 & 5 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 16 & -12 & -6 & 12 \\ 0 & 0 & 24 & -16 & -8 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}k \\ x_2 = -1 - \frac{1}{2}k \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 1 - \frac{1}{2}k \\ x_5 = k \end{cases}$$

∴方程组的解是

k为任意数

2) 解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -3 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 4 & -5 & 2 & 7 \\ 9 & -9 & 6 & -16 & 2 & 25 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -4 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 10 & -7 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 33 & -25 & 29 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 10 & -7 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 22 & -25 & 29 & 8 \\ 0 & 0 & 33 & -25 & 29 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -10 & 7 & -8 & -3 \\ 0 & 0 & 33 & -25 & 29 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

出现了(0,0,0,0,0,-1), 无解

$$3) \text{解: } \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 5 & -3 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -24 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{有唯一解: } x_1 = -8, x_2 = 3, x_3 = 6, x_4 = 0$$

4) 解:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 & 0 \\ 2 & -3 & 3 & -2 & 0 \\ 4 & 11 & -13 & 16 & 0 \\ 7 & -2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 0 & 17 & -19 & 20 \\ -1 & -24 & 27 & -29 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & 17 & -19 & 20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -1 & \cancel{19/17} & \cancel{-20/17} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -3/17 & 13/17 \\ 0 & -1 & \cancel{19/17} & \cancel{-20/17} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{17}k - \frac{13}{17}l \\ x_2 = \frac{19}{17}k - \frac{20}{17}l \\ x_3 = k \\ x_4 = l \end{cases}$$

得解:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -3 & 2 \\ 5 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 3 & -4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & -4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & 2 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

出现了 (0,0,0,0,-1), 无解

6) 解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 5 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & -10 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 & \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{1}{6} + \frac{5}{6}k \\ x_2 = \frac{1}{6} - \frac{7}{6}k \\ x_3 = \frac{1}{6} + \frac{5}{6}k \\ x_4 = k \dots \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{(1+5x_4)}{6} \\ x_2 = \frac{(1-7x_4)}{6} \\ x_3 = \frac{(1+5x_4)}{6} \\ x_4 \text{任意} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

一般解为

P154, T2

1) 解: 设 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4$, 则

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{5}{4} \\ x_2 = \frac{1}{4} \\ x_3 = -\frac{1}{4} \\ x_4 = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\therefore \alpha = \frac{5}{4}\alpha_1 + \frac{1}{4}\alpha_2 - \frac{1}{4}\alpha_3 - \frac{1}{4}\alpha_4$$

2) 解: 设 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4$, 则

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 0 + 3x_2 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{即 } \beta = \alpha_1 - \alpha_3$$

P155.T3

证明: 设 k_1, k_2, \dots, k_r, l 不全为 0, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r + l\beta = 0$

若 $l = 0$, 则 k_1, \dots, k_r 也不全为 0, 而 $k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r = 0$ 矛盾.

$$\therefore l \neq 0, \text{ 即 } \beta = \left(-\frac{k_1}{l}\right)\alpha_1 + \left(-\frac{k_2}{l}\right)\alpha_2 + \dots + \left(-\frac{k_r}{l}\right)\alpha_r \text{ 线性表出}$$

P155.T4

证明: 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0$, 则

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_n = 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

因为系数行列式 $\left| (a_{ij})' \right| = \left| a_{ij} \right| \neq 0$, 故上面方程组只有零解, 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

P155.T5

证明: 添加 t_{r+1}, \dots, t_n , 使 $t_1, t_2, \dots, t_r, t_{r+1}, \dots, t_n$ 两两不同
得向量组

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (1, t_1, t_1^2, \dots, t_1^{n-1}) \\ \alpha_r &= (1, t_r, t_r^2, \dots, t_r^{n-1}) \\ \alpha_{r+1} &= (1, t_{r+1}, t_{r+1}^2, \dots, t_{r+1}^{n-1}) \\ &\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ \alpha_n &= (1, t_n, t_n^2, \dots, t_n^{n-1}) \end{aligned}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的分量作成一个Vandermonder行列式 (公比两两不同) 且不等于 0, 由 上一题, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 于是它的任一部分线性无关

P155.T6

证: 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_3 + \alpha_1$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2$,

若 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$, 则即

$$(x_2+x_3)\alpha_1 + (x_3+x_1)\alpha_2 + (x_1+x_2)\alpha_3 = 0$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$\therefore \begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

$\therefore x_1, x_2, x_3$ 全为 0, 即 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

而若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_4, \alpha_4+\alpha_1$ 线性相关。

P155.T7

证明: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s(I)$ 的一个极大无关组 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}(I)'$ 及任一线性无关向量组 $\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \dots, \alpha_{jr}(I)''$

任取 (I) 中的一个向量 β 有 $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}, \beta \leftarrow (I) \rightleftharpoons (I)'$ 而 $(I)'$ 中只有 r 个向量, 由定理 2, a_{j_1}, a_{j_r}, β 线性相关, 而本来 $(II)''$ 线性无关, 故 (临界定理) $\beta \leftarrow (I)''$, 所以 $(I) \leftarrow (I)''$ 所以 $(I)''$ 是极大无关组。

P155.T8

证明:

设 $a_1, a_2, \dots, a_s (I), a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r} (I)',$ 及 (I) 的一个极大无关组 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r} (I)'',$ 已知 $(I) \leftarrow (I)',$ 故有

$$(I)' \rightleftharpoons (I) \rightleftharpoons (I)''$$

所以取 $(I)'$ 的极大无关组 $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_t} (I)'',$ 则 $t \leq r$ 且 $(I)'' \rightleftharpoons (I)' \rightleftharpoons (I)'',$ 那么 $(I)'' \rightarrow (I)''$ 由于 $(I)''$ 有 r 个向量且线性无关, 所以 (由定理 2 推论 1) $r \leq t$, 即 $r=t$, 故 $(I)'' = (I)', (I)'$ 线性无关。

$(I)'$ 是 (I) 的一个极大无关组。

P155.T9

证明: 设 (I) 的一个线性无关组 $(I)'$

1° 逐个检查 (I) 中的向量 α_i

2° a、若 $\alpha_i \leftarrow (I)'$, 则去掉 α_i , 检查下一个 α

b、若存在 $\alpha_i \leftarrow (I)'$, 则添加 α_i 到 $(I)'$ 中将 $(I)'$ 扩充为 $(I)''$, 回到检查第 1 个向量,

重复 1°、2°

若干步后 (\because 有限步后, 任意 $n+1$ 个 n 维向量也相关, 必含停止), 得到 $(I)', (I)'', \dots, (I)^{(k-1)}, (I)^{(k)}$

而 $(I)^{(k)}$ 不得再扩大, 于是 $(I)^{(k)}$ 是一个极大无关组, 是 $(I)' \subseteq (I)^{(k)}$ 。

P155.T10

1) 解: $\because a_1$ 与 a_2 的分量不成比例, 故 a_1 与 a_2 线性无关

2) 解: 考虑 $a_1, a_2, a_3 \quad \because 3a_1 + a_2 = a_3$ 去掉 a_3

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 28 \neq 0$$

考虑 a_1, a_2, a_4 , 取它们的后三个分量, \therefore 增加一个分量后仍然线性无关。

即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关

再考虑 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$, 因为分量行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

即 $\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4$ 所以它的极大线性无关组是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

P155.T11

1) 解:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & -4 \\ 1 & 4 & -9 & -16 & 22 \\ 7 & 1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 4 & -11 & -19 & 26 \\ 0 & 4 & -11 & -19 & 26 \\ 0 & 1 & -14 & -22 & 31 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -14 & -22 & 31 \\ 0 & 0 & 45 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

\therefore 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$, 且 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为一个极大无关组。

\therefore 秩 $(A) = 5$

2) 解: 略

P156.T12

证: 设 $(I)'$ 为 $(II)''$ 分别为 (I) 、 (II) 的极大无关组, 则有

$$(I)' \rightleftarrows (I) \leftarrow (II) \rightleftarrows (II)'$$

设 $(I)'$ 含 r 个向量, $(II)'$ 含七个向量, 因为 $(I)'$ 线性无关, 且 $(I)' \leftarrow (II)'$, 所以 $r \leq t$, 即秩 $(I) \leq \text{秩}(II)$

P156.T13

证明: 设 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大线性无关组则得下面表示序列

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir} \rightleftarrows \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rightarrow \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$$

因为单位向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关, 由 (定理 2 推论), 得 $n \leq r$ 故 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 本身, 即证得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

P156.T14

证明: 略

P156.T15

证明：“ \Leftarrow ”若系数行列式 $|a_{ij}| \neq 0$, 则由Cramer法则, 对任何常数 b_1, b_2, \dots, b_n 有唯一解。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

“ \Rightarrow ” 则原方程组为 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_n\beta_n = b$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

其中 $\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ 为A的列向量组, \because 对任何都有解。

依次定 $b = \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则得

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \rightarrow \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$$

从而 $\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ 线性无关, 列秩 $(A)=n$, 即秩 $(A)=n$, 由定理 5, $|A| \neq 0$

P156.T16

证明: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ (I)及 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ (II), 且秩(I)=秩(II)=t, 设 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{it}$ (III)为(I)

的极大无关组 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{it}$ (IV)为(II)的极大无关组, 那么, $(III) \Leftrightarrow (I) \leftarrow (II) \Leftrightarrow (IV)$

任取(II)中一个向量 β , 组成 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{it}, \beta$ —(V), 则 $(V) \leftarrow (II) \leftarrow (IV)$, 因为(IV)只有七个向量, 所以(V)线性相关, 而(III)线性无关。

所以 $\beta \leftarrow (III)$ 即 $(II) \leftarrow (III)$ $\therefore (II) \Leftrightarrow (III)$

$\therefore (I) \Leftrightarrow (III) \Leftrightarrow (II)$ (I)与(II)等价

P156.T17

证明: $\because \beta_1 = \alpha_2 + \dots + \alpha_r, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_r, \dots, \beta_r = \alpha_1 + \dots + \alpha_{r-1}$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r \rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$

令 $r = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_r = (r-1)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r)$

$\therefore \alpha_i = \frac{1}{r-1}r - \beta_i$ 即 α_i 可以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表示

$\therefore \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 秩必相同

P156.T18

$$\textcircled{1} \quad A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \therefore \text{秩}(A)=4$$

$$\textcircled{2} \quad A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \therefore \text{秩}$$

(A)=3

$$\textcircled{3} \quad A \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 104 & 21 & 9 & 17 \\ 7 & 6 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B \quad \begin{array}{l} \text{显然 } B \text{ 中有 2 阶子式不等于 0} \\ \text{且所有 3 阶子式等于 0} \end{array} \quad \therefore \text{秩}(B)=2 \quad \text{秩}(A)=2$$

$$\textcircled{4} \quad A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 3 & 13 & 28 \\ 0 & 5 & 6 & 28 & 61 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 18 \\ 0 & 0 & 6 & 18 & 36 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \therefore \text{秩}(A)=3$$

\textcircled{5}

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \therefore \text{秩}(A)=5$$

P157. T19

$$\textcircled{1} \quad \because \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2;$$

$$\therefore \text{当 } \lambda \neq 1 \text{ 时, 有唯一解。} \quad x_1 = \frac{-(\lambda+1)}{\lambda+2}, x_2 = \frac{1}{\lambda+2}, x_3 = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2}.$$

\therefore \text{当 } \lambda = -2 \text{ 时, 三个方程解相加, 得 } 0=3 \text{ (无解)。}

\therefore \text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, 变为一个方程 } x_1+x_2+x_3=1 \text{ 即 } x_1=1-x_2-x_3. \quad x_2, x_3 \text{ 任取。}

$$\text{②} \because \text{系数解列式} \begin{vmatrix} \lambda+3 & 1 & 2 \\ \lambda & \lambda-1 & 1 \\ 3(\lambda+1) & \lambda & a+3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - \lambda^2 = \lambda^2(\lambda-1)$$

而 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时，有唯一解：(用Cramer法则)

$$x_1 = \frac{\lambda^3 + 3\lambda^2 - 15\lambda + 9}{\lambda^2(\lambda-1)}, x_2 = \frac{\lambda^3 + 12\lambda - 9}{\lambda^2(\lambda-1)}, x_3 = \frac{-4\lambda^2 + 3\lambda^2 + 12\lambda - 9}{\lambda^2(\lambda-1)}.$$

$$\text{而当 } \lambda=0 \text{ 时为} \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_3 = 3 \end{cases} \quad \text{①式+②式-③式得 } 0=-3, \text{ 矛盾。}$$

$$\text{当 } \lambda=1 \text{ 时为} \begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + \dots + x_3 = 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 3 \end{cases} \quad \text{①式+②式两倍-③式得 } 0=2, \text{ 矛盾。}$$

$$\text{③系数行列式} \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix} = b(1-a)$$

$$\text{当 } \lambda \neq 0 \text{ 且 } a \neq 1 \text{ 时, 有唯一解。} x_1 = \frac{1-2b}{b(1-a)}, x_2 = \frac{1}{b}, x_3 = \frac{4b-2ab-1}{b(1-a)}.$$

若 $b=0$, 则②式-③式得 $0=-1$ 。矛盾。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

若 $b \neq 0$ 而 $a=1$ 。化为

$$\text{①}-\text{③} \text{ 得 } (1-2b)x_2=0$$

$$\text{①}-\text{②} \text{ 得 } (1-b)x_2=1$$

$$\therefore x_2 \neq 0 \text{ 义与 } (1-2b)=0 \text{ 即 } b=\frac{1}{2} \left(b \neq \frac{1}{2} \text{ 则矛盾无解} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3 = 3 \text{ 即} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_2 = 2 \end{cases} \text{ 即} \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 \\ x_2 = 2 \end{cases} x_3 \text{ 任意值} \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

此时化为

P157.T20、

$$\text{1) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & -1 & -2 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即 x_3, x_4, x_5 为自由未知量。

$$\begin{array}{ll}
 (1, 0, 0) & \eta_1 = (1, -2, 1, 0, 0) \\
 (0, 1, 0) & \eta_2 = (1, -2, 0, 1, 0) \\
 \text{令 } (x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 1) & \text{得: } \eta_3 = (1, -2, 0, 0, 1)
 \end{array}$$

2)

$$\begin{array}{c}
 \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -6 & 6 & 15 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & -5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & -4 \end{array} \right) \\
 \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 1 & -2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{6} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{5}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{array}$$

即 x_1, x_2, x_5 为基本, x_3, x_4 为自由未知量。

$$\begin{array}{l}
 \eta_1 = (-1, 1, 1, 0, 0) \\
 (x_3, x_4) = (1, 0) \\
 \text{令 } (x_3, x_4) = (0, 1), \text{ 得 } \eta_2 = \left(\frac{7}{6}, \frac{5}{6}, 0, \frac{1}{3}, 1 \right)。
 \end{array}$$

即基础解系为 $(-1, 1, 1, 0, -2)$ 和 $(7, 5, 0, 2, 6)$

$$4) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 4 & -5 \\ 0 & 4 & -4 & 4 & -5 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & -8 & 4 & -5 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & +\frac{1}{2} & -\frac{7}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_4 + \frac{7}{8}x_5 \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_4 + \frac{7}{8}x_5 \\ x_3 = -\frac{1}{2}x_4 + \frac{7}{8}x_5 \end{cases}$$

$$(x_4, x_5) = (1, 0) (0, 1) \text{ 得基础解系} \begin{cases} y_1 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right) \\ y_2 = \left(\frac{7}{8}, \frac{5}{8}, -\frac{5}{8}, 0, 1 \right) \end{cases}$$

令

P157. T22

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & b-5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{array} \right)$$

由于有解 \Leftrightarrow 秩(系) = 秩(增) 故有解 $\Leftrightarrow a=0, b=2$.

此时, x_1, x_2 为基础未知量。特解为 $\eta_0 = (-2, 3, 0, 0, 0)$

x_3, x_4, x_r 为自由未知量, 依次取

$$(x_3, x_4, x_r) = (1, 0, 0) \quad \eta_1 = (1, -2, 1, 0, 0)$$

$$(x_3, x_4, x_r) = (0, 1, 0) \quad \text{得} \quad \eta_2 = (1, -2, 0, 1, 0)$$

$$(x_3, x_4, x_r) = (0, 0, 1) \quad \eta_3 = (5, -6, 0, 0, 1)$$

通解为 $\eta_0 + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + k_3 \eta_3$ (k_1, k_2, k_3 为任意常数。)

P158. T23

$$\text{增广矩阵} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_2 \\ & & -1 & 0 & a_3 \\ & & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ & & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ & & & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 a_i \neq 0$$

因为系数矩阵秩为 4。增广矩阵秩为 5

$$\text{秩为 4} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 a_i = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 a_i = 0$$

故由有解判别定理, 方程组有解 \Leftrightarrow 秩(系) = 秩(增)

$$\sum_{i=1}^5 ai = 0 \quad \text{有解时, 即 } \left. \begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & -1 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & a_2 + a_3 + a_4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & a_3 + a_4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right\}$$

特解 $r_0 = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4, a_2 + a_3 + a_4, a_3 + a_4, 0)$ 。

导出组基础系（只有一个自由求知数 $x_5=1$ ）为 $\eta = (1, 1, 1, 1, 1)$ 。

所以方程组的通解为 $r_0 + k\eta$ 。 k 为任意的数。

P158.T24

设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是某齐次方程组的基础解系，而 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是方程组的线形无关解组。则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s \Leftrightarrow \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 。由于等价且都线形无关，必有 $s=t$ 。由传递性，方程的任一解可由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 线形表示，也可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 线形表示。 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 也是基础解系。

P158.T25

由于秩（系）=r，故基础解系会 $n-r$ 个向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ ($r < n$)

而它们任意 $n-r$ 解 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{n-r}$ 。如果线性无关。则由（补 6, P157）的证明方法：（见 3.41.6.*）。秩 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}) =$ 秩 $(\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{n-r}) = n-r$ 。且 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{n-r} \Leftarrow \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 。故， $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{n-r} \Leftrightarrow \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ （再由上题（24 题）知向量 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{n-r}$ 也为方程组的基础解系。

P158.T26

证明：设 $\eta_v = (k_{v1}, k_{v2}, \dots, k_{vn})$ ($v=1, 2, \dots, t$) 为方程组 $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_j$ ($j=1, 2, \dots, s$) 的解，

即必有 $\sum_{j=1}^n a_{ij}k_{vj} = b_j$ $\begin{cases} v=1 \dots t \\ i=1 \dots s \end{cases}$ ，那么 $\eta = \sum_{v=1}^t u_v \eta_v$ 代入方程组得

$\sum_{j=1}^n a_{ij} \sum_{v=1}^t u_v k_{vj} = \sum_{v=1}^t (\sum_{j=1}^n a_{ij} k_{vj}) u_v = \sum_{v=1}^t b_i u_v = b_i \sum_{v=1}^t u_v = b_i$ (由已知条件 $\sum_{v=1}^t u_v = 1$)

$\therefore \eta = \sum_{v=1}^t u_v \eta_v$ 是方程的解。

此题反过来也成立，即

若 $\sum_{v=1}^t u_v \eta_v$ 为非齐次方程的解，且 η_v 也是解，则必有 $\sum_{v=1}^t u_v = 1$ 。

P158.T27

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{c} a_0, a_1 \cdots a_n \\ a_0 \cdots a_n \\ a_0 \cdots a_n \\ b_0 \cdots b_m \\ b_0 \cdots b_m \\ b_0 \cdots b_m \end{array} \right| = (-1)^m \left| \begin{array}{c} b_0, b_1 \cdots b_n \\ a_0, a_1 \cdots a_n \\ a_0 \cdots a_n \\ b_0 \cdots b_m \\ b_0 \cdots b_m \\ b_0 \cdots b_m \end{array} \right| = (-1)^m \cdots = (-1)^{mn} \left| \begin{array}{c} b_0, b_r \cdots b_m \\ b_0 \cdots b_m \\ a_0 \cdots a_n \\ a_0 \cdots a_m \end{array} \right| = (-1)^{mn} R(g.f) \end{array}$$

$R(f \cdot g) =$ 其中 $n = \partial(f(x))$ $m = \partial(g(x))$

158. T28

①

$$\begin{aligned} R(f \cdot g) &= \begin{vmatrix} 5 & -6x & 5x^2 - 16 & 0 \\ 0 & 5 & -6x & 5x^2 - 16 \\ 1 & -x - 1 & 2x^2 - x - 4 & 0 \\ 0 & 1 & -x - 1 & 2x^2 - x - 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -x + 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5x^2 + 5x + 4 \\ 1 & -x - 1 & 2x^2 - x - 4 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -6x^2 + 9x + 9 & (2x^2 - x - 4) \\ 0 & -x + 5 & -5x^2 + 5x + 4 \\ 1 & -x - 1 & 2x^2 - x - 4 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

直接展开方程相加

$$\begin{aligned} &= 32x^4 - 96x^3 + 96x^2 - 64 \\ &= 32(x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2) \\ &= 32(x^2 - 1)(x^2 - 3x + 2) \\ &= 32(x - 1)^2(x + 1)(x - 2) \end{aligned}$$

有 4 个解是 $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 2$, $x_4 = -1$ 。

$$\begin{cases} 5y^2 - 6y - 11 = 0 \\ y^2 - 2y - 3 = 0 \end{cases}$$

用 $x = 1$ 代入在方程组得 有公共解 $y = -1$, 即 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$

$$\begin{cases} 5y^2 - 12y + 4 = 0 \\ y^2 - 3y - 3 = 0 \end{cases}$$

用 $y = 2$ 代入在方程组得 有公共解 $y = 2$, 即 $\begin{cases} y = 2 \\ y = -1 \end{cases}$

$$\begin{cases} 5y^2 + 6y - 11 = 0 \\ y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

用 $x = -1$ 代入在方程组得 有公共解 $y = 1$, 即 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2 \\ y = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

即得到三组解

第四章 矩阵练习题参考答案

P197. T1

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 6 & 1 & 0 \\ 8 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

①解:

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

\therefore

$$AB = \begin{pmatrix} a+b+c & a^2+b^2+c^2 & ac+b^2+ac \\ a+b+c & ac+b^2+ac & a^2+b^2+c^2 \\ 3 & a+b+c & a+b+c \end{pmatrix}$$

②解:

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 1 & b & b \\ 1 & c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+ac+c & b+ab+c & c+a^2+c \\ a+bc+b & b+b^2+b & c+ab+b \\ a+c^2+a & b+bc+a & c+ac+a \end{pmatrix}$$

$$\therefore AB - BA = \begin{pmatrix} b-ac & a^2+b^2+c^2-b-ab-c & b^2-a^2+2ac-2c \\ c-bc & 2(ac-b) & a^2+b^2+c^2-b-ab-c \\ 3-2a-c^2 & c-bc & b-ac \end{pmatrix}$$

P198. T 2

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 5 & 5 \\ 12 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

①解:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}^3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

②解:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi+\theta) & -\sin(\varphi+\theta) \\ \sin(\varphi+\theta) & \cos(\varphi+\theta) \end{pmatrix}$$

④解:

$$\therefore \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}$$

5 解:

$$(2,3,-1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 - 3 + 1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} (2,3,-1) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

6 解:

$$\text{原式=} \begin{pmatrix} x, y, 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + b_1 \\ a_{12}x + a_{22}y + b_2 \\ b_1x + b_2y + c \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \therefore A^n = \begin{cases} 2^n E & n=2k \text{ 时} \\ 2^{n-1} A & n=2k+1 \text{ 时} \end{cases}$$

$$8 \text{ 解: } \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad \text{而}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda^k & c_k^1 \lambda^{k-1} & c_k^2 \lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & c_k^1 \lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^{k+1} & c_{k+1}^1 \lambda^k & c_{k+1}^2 \lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^{k+1} & c_{k+1}^1 \lambda^k \\ 0 & 0 & \lambda^{k+1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & c_n^1 \lambda^{n-1} & c_n^2 \lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & c_n^1 \lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{1}{2}n(n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} \therefore$$

P198. T3

$$\textcircled{1} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 4 \\ 11 & 2 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore f(A) = A^2 - A - E = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 8 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} - E = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 8 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -15 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\therefore f(A) = A^2 - 5A + 3E = A^2 - \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -15 & 12 \end{pmatrix} = 0$$

P199. T4.

$$\textcircled{1} \text{ 设 } X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}, XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix},$$

由 $AX = XA \Rightarrow c = 0, a+b = b+d \Rightarrow a = d$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} a, b \text{ 任取。}$$

$$\textcircled{2} \because XA = AX \Leftrightarrow X(A-E) = (A-E)X. \quad \bar{A} = A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{设 } X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}, \quad X\bar{A} = \begin{pmatrix} 3x_{13} & x_{13} & 2x_{12} + x_{13} \\ 3x_{23} & x_{23} & 2x_{22} + x_{23} \\ 3x_{33} & x_{33} & 2x_{32} + x_{33} \end{pmatrix},$$

$$\bar{A}X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2x_{31} & 2x_{32} & 2x_{33} \\ 3x_{11} + x_{21} + x_{31} & 3x_{12} + x_{22} + x_{32} & 3x_{13} + x_{23} + x_{33} \end{pmatrix}$$

$$\therefore x_{12} = x_{13} = 0$$

$$\begin{array}{lll} x_{21} = 3a & x_{31} = 3c & x_{11} = b + c - a - c \\ x_{22} = b \Rightarrow x_{32} = c \Rightarrow x_{22} = 0 & & \\ \text{令 } x_{23} = 2c & x_{33} = b + c & x_{13} = 0 \end{array} \quad \therefore x = \begin{pmatrix} b-a & 0 & 0 \\ 3a & b & 2c \\ 3c & c & b+c \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样设 } X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}, AX = \begin{pmatrix} x_{25} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, XA = \begin{pmatrix} 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & x_{21} & x_{22} \\ 0 & x_{31} & x_{32} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} x_{21} = x_{31} = x_{32} = 0, x_1 = x_{22} = x_{33}, x_{23} = x_{12} \end{array} \quad \therefore x = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & 0 & x_{11} \end{pmatrix}$$

P199. T5

$$\text{设 } X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \quad \therefore AX = XA$$

左边 i 行 j 列的元为 $a_i x_{ij}$

右边 i 行 j 列的元素 $x_{ij} a_j$

$$\therefore i \neq j, a_i x_{ij} = a_j x_{ij} \Rightarrow (a_i - a_j)x_{ij} = 0 (\because a_i \neq a_j)$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} x_{11} & & & \\ & x_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_{nn} \end{pmatrix}$$

只是对角矩阵

P199. T6

$$A = \begin{pmatrix} a_1 E_{n_1} & & & \\ & a_2 E_{n_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_r E_{n_r} \end{pmatrix} \quad (n_1 + n_2 + \dots + n_r = n)$$

$$\text{令 } X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1r} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2r} \\ \cdots & \cdots & & \\ X_{r1} & X_{r2} & \cdots & X_{rr} \end{pmatrix}$$

且 X_{ij} 为 $n_i \times n_j$ 型才能 $AX = XA$ 分块相乘, 应有

$$\left. \begin{array}{l} \text{左边 } AX \text{ 第 } i \text{ 块行 } j \text{ 块列为 } a_i E_{ni} \cdot X_{ij} = a_i X_{ij} \\ \text{右边 } XA \text{ 第 } i \text{ 块行 } j \text{ 块列为 } X_{ij} \cdot a_j E_{nj} = a_j X_{ij} \end{array} \right\} \because i \neq j, a_i \neq a_j$$

$$X = \begin{pmatrix} X_{11} & & \cdots & \\ & X_{22} & \cdots & \\ & & \ddots & \\ \cdots & \cdots & & \\ & & \cdots & X_{rr} \end{pmatrix}$$

为与 A 同类型的准对角矩阵

$\therefore i \neq j$ 时, $x_{ij} = 0$. \therefore

P199. T7

$$AE_{12} = \begin{pmatrix} 0 & a_{11} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{21} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{31} & \cdots & 0 \\ 0 & \vdots & \cdots & 0 \\ 0 & a_n & \cdots & 0 \end{pmatrix}, E_{12}A = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & \ddots & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

① 设 $A = (a_{ij})_{nxn}$.

$\therefore A$ 的第一列 $a_{11} = a_{22}$, 其余 $a_{k1} = 0 (k > 1)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & * & & & \\ 0 & a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & & & & * & \\ \vdots & & & & & \\ 0 & & & & & \end{pmatrix}$$

A 的第二行 $a_{22} = a_{11}$, 其余 $a_{2s} = 0 (s \neq 2)$

$$\textcircled{2} \quad AE_{ij} = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ 0 \\ a_{ni} \end{pmatrix}, E_{ij}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} i\text{行}$$

$\therefore A$ 的第*i*列: $a_{ii} = a_{jj}$, 且 $a_{ki} = 0$, ($k \neq i$)

A 的第*j*行, $a_{jj} = a_{ii}$ 且 $a_{js} = 0$, ($s \neq j$)

③由于 A 与所有*n*级矩阵可换, 故 A 与 $E_{11}, E_{12}, E_{13} \cdots E_{1n}$ 可换

$\therefore A$ 的第一列全为 0, $AE_{11} = E_{11}A \Rightarrow A$ 的第一行只留下 a_{11} 可解非 0

$AE_{12} = E_{12}A \Rightarrow A$ 的第二行只留下 $a_{22}=a_{11}$ 其余全为 0

$AE_{13} = E_{13}A \Rightarrow A$ 的第三行只留下 $a_{33}=a_{11}$, 其余全为 0

$AE_{1n} = E_{1n}A \Rightarrow A$ 的第*n*行只留下 $a_{nn}=a_{11}$. 其余全为 0

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & 0 \\ & a_{11} & \\ & & a_{11} \\ 0 & & a_{11} \end{pmatrix} = aE$$

所以 $(a = a_{11})$

P200. T8

$$A(B+C) = AB + AC = BA + CA = (B+C)A$$

$$A(BC) = (AB)C = (BA)C = B(AC) = BC(A) = BC(A) = (BC)A$$

P200. T9

$$\Rightarrow \text{"若 } A^2 = A, \text{ 则 } \frac{1}{4}(B^2 + 2B + E) = \frac{1}{2}(B + E) \Rightarrow \frac{1}{4}B^2 - \frac{1}{4}E = 0 \text{ 得 } B^2 = E$$

$$\Leftarrow \text{"若 } B^2 = E, \text{ 则 } A^2 = \frac{1}{4}(B^2 + 2B + E) = \frac{1}{4}(E + 2B + E) = \frac{1}{2}(B + E) = A$$

P200. T10

反设 $A \neq 0$, 不防设 $a_{st} \neq 0$, 那么 $a_{ts} \neq 0$, 那么 A^2 中第 s 行 s 列的元素 为

$$\sum_{k=1}^n a_{sk}a_{ks} = \sum_{k=1}^n a_{sk}a_{ks} = a_{s1}^2 + a_{s2}^2 + a_{st}^2 + \cdots + a_{sn}^2 > 0.$$

$\therefore A^2 \neq 0$, 矛盾, 即 $A = 0$.

P200. T11

$$\Rightarrow (AB)' = AB \Rightarrow AB = (AB)' = B'A' = BA (\because B' = B, A' = A)$$

\Leftarrow 如果 $AB = BA$, 那么 $(AB)' = B'A' = BA = AB$, 为对称矩阵。

P200. T12

$$\text{设 } A=B+C, \quad (B'=B, C'=-C)$$

$$\therefore A'=B'+C'=B-C \quad \therefore B=\frac{1}{2}(A+A'), C=\frac{1}{2}(A-A')$$

恰如 $B'=B, C'=-C$, 即为所求.

P200. T13

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \vdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \vdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & & x_n^{n-1} \end{pmatrix}, D' = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\therefore DD' = (a_{ij})_{n \times n} = A, a_{ij} = \sum_{k=1}^n x_k^{i-1+j-1} = s_{i+j-2}$$

$$\therefore |A| = |(a_{ij})| = |DD'| = |D|^2 = \prod_{1 \leq i \leq j \leq n} (x_j - x_i)^2$$

P200. T14

" \Rightarrow " 取 B_i 为 B 的一个非 0 列 $\therefore AB_i = 0$, 而 $AX = 0$ 有非零解, 故 $|A| = 0$.

" \Leftarrow " $\because |A| = 0 \therefore AX = 0$ 有非零解 $x_0 \neq 0$, 令 $B_1 = x_0, B_2 = 2x_0, \dots, B_n = nx_0$

而 B 的列由 B_1, B_2, \dots, B_n 组成, 所以 $B \neq 0$

P200. T15

考虑 AE . $\because E$ 的每一列 E_i 去乘 A 的各行为 0, $\therefore AE = 0$

又 $AE = A \therefore A = 0$

P200. T16.

① 考虑齐次方程组, $C'x = 0$ ($\because C'_{n \times r}$) 只含 r 个未知量,

而 秩 $(C') = \text{秩}(C) = r = \text{未知量个数} \therefore C'X = 0$ 只有零解

$\therefore BC = 0 \Rightarrow C'B' = 0' = 0$ $\therefore B'$ 的各列 (都是适合 $C'X = 0$) 都为 0

$\therefore B' = 0, B = 0$

② 若 $BC = C \Rightarrow (B - E)C = 0 \Rightarrow B - E = 0 \Rightarrow B = E$

P200. T17

设 A 的行向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, (I), B 的行向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ (II), 而
 $C = A + B$ 的行向量为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$, (III). 那么

$$r_1 = \alpha_1 + \beta_1, r_2 = \alpha_2 + \beta_2, \dots, r_m = \alpha_m + \beta_m.$$

\therefore 设 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{ir}$ 为 (I) 的极大无关组, 那么秩 (A) = 秩 (I) = r

设 $\beta_{j1}, \dots, \beta_{jp}$ 为 (II) 的极大无关组, 那么秩 (A) = 秩 (II) = p

$$\therefore (III) \leftarrow (I) \cup (II) \leftarrow (I) \cup (II) = \{\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{ir}, \beta_{j1}, \dots, \beta_{jp}\} \dots \quad (IV)$$

\therefore 秩 (A+B) = 秩 (C) = 秩 (III) \leq 秩 (IV) $\leq r+p =$ 秩 (A) + 秩 (B)。

P200. T18

设秩 (A) = r, 那么, 线性方程组 AX=0 的基础解系可设为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 。

设 B 的各列为 B_1, B_2, \dots, B_n . $\because AB=0$. 说明 B 的每列 B_j 乘以 A 的每行都为 0, 即时 B_j 是 AX=0 的解。 \therefore

$$B_j \leftarrow \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$$

$$\therefore B_1, B_2, \dots, B_n \leftarrow \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$$

$$\therefore \text{秩}(B) = \text{秩}(B_1, B_2, \dots, B_n) \leq \text{秩}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}) = n-r$$

$$\therefore \text{秩}(A) + \text{秩}(B) \leq r + n - r = n$$

P200. T19

若 $A^k=0$

$$\therefore (E-A)(E+A+A^2+\dots+A^{k-1}) = E + A + A^2 + \dots + A^{k-1} - A - A^2 - \dots - A^{k-1} - A^k$$

$$= E - A^k = E - 0 = E$$

$$\therefore (E-A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$$

P201. T20

$$\textcircled{1} \quad A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, |A|=1 \quad \therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & -1 \\ 2 & 1 & | & 0 \\ 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{令 } A^{-1} = X = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$$

$$\therefore AX = \begin{pmatrix} A_1X_1 + A_2X_3 & A_1X_2 + A_2X_4 \\ A_3X_1 & A_3X_2 \end{pmatrix}$$

$$A_3X_1 = 0 \Rightarrow A_3^{-1} \text{ 存在} \quad \therefore X_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A_3X_2 = E_2 \Rightarrow X_2 = A_3^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_1X_1 + A_2X_3 = E_1 \Rightarrow A_2X_3 = E_1 \Rightarrow X_3 = -1$$

而 $A_1X_2 + A_2X_4 = 0 \Rightarrow X_4 = -A_2^{-1}A_1X_2$

$$X_4 = -(-1)(1,1) \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{③ } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 0 + 6 - 3 - 0 - 2 = -1 \quad \begin{array}{lll} A_{11} = -1 & A_{21} = 4 & A_{31} = 3 \\ A_{12} = -1 & A_{22} = 5 & A_{32} = 3 \\ A_{13} = 1 & A_{23} = -6 & A_{33} = -4 \end{array}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 1 & -6 & -4 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = |A|A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{array}{c} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{array} \right) A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} A_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \quad A_1^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\text{④ } A = \begin{pmatrix} E & O \\ -A_3A_1^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 - A_3A_1^{-1}A_2 \end{pmatrix} A_4 - A_3A_1^{-1}A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B_4$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ O & B_4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & O \\ -A_3A_1^{-1} & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -26 & 17 \\ 2 & -1 & 20 & -13 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{5 法 1: } A^2 = 4E \therefore A^{-1} = \frac{1}{4}A$$

$$\text{法2: } \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 00 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 & -2 & -2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 4 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(E \mid \frac{1}{4} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) \right)$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{4} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) = \frac{1}{4} A$$

$$\textcircled{6} A = \left(\begin{array}{cccc} 3 & 3 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{array} \right) (A, E) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -7 & -5 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 37 & 26 & -5 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 17 & 12 & -2 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -7 & -5 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 20 & 14 & -3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -33 & -23 & 4 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -43 & -30 & 7 & 0 & -3 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -7 & 5 & 12 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & -5 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 41 & -30 & -69 & 111 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -59 & 43 & 99 & 159 \end{array} \right)$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{cccc} -1 & 5 & 12 & -19 \\ 3 & -2 & -5 & 8 \\ 41 & -30 & -69 & 111 \\ -59 & 43 & 99 & -159 \end{array} \right)$$

$$7 \quad A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad A^{-1} = \left(\begin{array}{cc} (1 & 3)^{-1} & -\left(\begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} -5 & 7 \\ 2 & -3 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{array} \right) \\ 0 & \left(\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{cccc} 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$8 \quad A = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 5 & 7 & 1 & 8 \\ -1 & -3 & -1 & -6 \end{array} \right) \quad A^{-1} = \left(\begin{array}{cc} (2 & 1)^{-1} & 0 \\ -\left(\begin{array}{cc} 1 & 8 \\ -1 & -6 \end{array} \right)^{-1} \left(\begin{array}{cc} 5 & 7 \\ -1 & -3 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{array} \right)^{-1} & \left(\begin{array}{cc} 1 & 8 \\ -1 & -6 \end{array} \right)^{-1} \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccccc} 2 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ \hline -5 & 7 & \frac{1}{2}(-6 & -8) & -5 & -7 & -3 & -4 \\ 2 & -2 & \frac{1}{2}(1 & 1) & 2 & -2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

⑨

$$\left(\begin{array}{cccc|ccccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 6 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 5 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccccc} 1 & 2 & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{6} & \frac{10}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{7}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -7 & 20 \\ -7 & -3 & 5 & -10 \\ 9 & 3 & -3 & 6 \\ 3 & 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

⑩ 求 A^{-1}

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

方法 1: 令 $B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}$

$$\therefore B^{-1} = (E - C)^{-1} = E + C + C^2 + C^3 + C^4$$

$$A^{-1} = (2B)^{-1} = \frac{1}{2} B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} & \frac{1}{32} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} & \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & & \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & & \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & & & \end{pmatrix}$$

$$\text{方法 2: } A = \left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & & 2 & 1 & 0 \\ & & 0 & 2 & 1 \\ & & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}$$

$$A^0 = \begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}OC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|cc} \begin{matrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{matrix} & \begin{matrix} -B^{-1} & D & C \end{matrix} \\ \hline & \begin{matrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 8 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{matrix} \end{array} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} & \frac{1}{32} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

P201. T21

设 $A_{k \times k}$, C_{rr} 则 $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix}$ 令 $Y = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}$ 才能乘

$$XY \text{ 与 } YX, \quad \text{而 } XY = \begin{pmatrix} AY_3 & AY_4 \\ CY_1 & CY_2 \end{pmatrix} \quad YX = \begin{pmatrix} Y_2C & Y_1A \\ Y_4C & Y_3A \end{pmatrix}$$

$$\text{若 } Y = X^{-1}, \text{ 则 } XY = YX = E \Rightarrow \begin{cases} CY_1 = 0, Y_1A = 0 \Rightarrow Y_1 = 0 \\ AY_4 = 0, Y_4C = 0 \Rightarrow Y_4 = 0 \end{cases}$$

$$AY_3 = Y_3A = E_k \quad Y_3 = A^{-1} \quad X^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} \\ \therefore CY_2 = Y_2C = E_r \quad Y_2 = C^{-1} \quad \therefore$$

P201. T22

$$X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ a_n & 0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

将 由 21 题, (见上面)

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & a^{n-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^1 & 0 & & & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & & & 0 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & a_{n-1}^{-1} & 0 & \end{pmatrix}$$

P202. T23.

$$\textcircled{1} \because \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

\textcircled{2} 解

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{6} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$x = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 11/6 & 1/2 & 1 \\ -1/6 & -1/2 & 0 \\ 2/3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{3} \because AX=B, \text{ 则 } X=A^{-1}B, \text{ 故 } (A, B) = \left(\begin{array}{cccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & & 0 \\ 1 & 1 & -1 & \ddots & \\ \ddots & \ddots & \ddots & -1 & \\ & \ddots & 1 & -1 & \\ 0 & & 1 & 2 & \end{pmatrix}$$

所以

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad |A| = 6. \quad A_{11} = 2, \quad A_{21} = 1, \quad A_{31} = 4$$

$$A_{12} = 2, \quad A_{22} = 1, \quad A_{32} = -2$$

$$A_{13} = -2, \quad A_{23} = 2, \quad A_{33} = 2$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 8 \\ 4 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

P202. T24

$$\textcircled{1} \because AA^{-1} = A^{-1}A = E \therefore A'(A^{-1})' = (A^{-1})' A' = E \therefore (A')^{-1} = (A^{-1})'$$

若 $A' = A$, 则 $(A^{-1})' = (A')^{-1} = A^{-1}$, 即 A^{-1} 对称

若 $A' = -A$, 则 $(A^{-1})' = (A')^{-1} = (-A)^{-1} = -(A^{-1})$ 即 A^{-1} 反对称

\textcircled{2} 若 $A' = -A$, 那么, 由 $|kA| = k^n |A|$

$$\therefore |A| = |A'| = |A| = (-1)^n |A| = -|A| \therefore |A| = 0$$

于是 A 不可逆。

P202. T25

\textcircled{1} 若 A, B 上三角形, 则 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 当 $i > j$ 时, $a_{ij} = 0, b_{ij} = 0$

$$\therefore \text{当 } i > j \text{ 时, } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=i}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} 0 \cdot b_{kj} + \sum_{k=i}^n a_{ik} 0 = 0$$

$\therefore C = AB$ 为上三角

若 A, B 为下三角形, 则 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 当 $i < j$ 时, $a_{ij} = 0, b_{ij} = 0$. $C = AB. C = (c_{ij})_{n \times n}$

$$\therefore \text{当 } i < j \text{ 时, } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^i a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=i+1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^i a_{ik} 0 + \sum_{k=i+1}^n 0 b_{kj} = 0 + 0 = 0$$

$\therefore C = AB$ 为下三角

\textcircled{2} (i) 若 A 为上三角, 考虑 $|A|$ 中 A_{ij} , ($i < j$)

\therefore

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & a_{1i} & \cdots & a_{1j-1} & a_{ij+1} & \cdots & a_{1n} \\ \ddots & & a_{i-1,i-1} & a_{i-1i} & \cdots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ & 0 & & a_{i+1i+1} & a_{i+1j-1} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ & 0 & \cdots & \cdots & \ddots & a_{ij-1} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{j-1n} \\ & & & & 0 & a_{ji+1} & \cdots & a_{jn} \\ & & & & & a_{j+1j+1} & \cdots & a_{j+1n} \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & \cdots \\ & & & & & & & & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

而 $i < j$, A_{ij} 位于 A^* 的对角线下方, $\therefore A^*$ 上三角, 故 A^{-1} 上三角

\because 当 A 为下三角时, A^T 上三角 $\therefore (A^T)^{-1}$ 为上三角, 即 $(A^{-1})^T$ 为上三角, 故 A^{-1} 为下三角。

P202. T26

$$\because AA^* = A^*A = |A|E \therefore |A^*| |A| = |A|^n$$

$$\text{若 } |A| \neq 0, \therefore |A^*| = |A|^{n-1}$$

$$\text{若 } |A| = 0, \text{ 由 P205.18 题 (P4.51.3.2). } AA^* = 0 \therefore \text{秩}(A) + \text{秩}(A^*) \leq 1$$

$$(i) \text{ 若秩}(A) = 0 \Rightarrow A = 0 \Rightarrow A^* = 0 \Rightarrow |A^*| = 0 \therefore |A^*| = |A|^{n-1} (\because n \geq 2)$$

$$(ii) \text{ 若秩}(A) \neq 0 \Rightarrow \text{秩}(A^*) < n \Rightarrow |A^*| = 0 \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1} = 0$$

总之, 各种情形均有 $|A^*| = |A|^{n-1}$

P202. T28

$$\textcircled{1} \quad (\text{AE}) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right) \quad \therefore A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} A = \begin{pmatrix} B & B \\ B & -B \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} B$$

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -E & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & B \\ B & -B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & B \\ O & -2B \end{pmatrix} \quad \text{而} \quad \begin{pmatrix} B & B \\ O & -2B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & \frac{1}{2}B^{-1} \\ 0 & (-2B)^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}B & \frac{1}{4}\mathbf{B} \\ 0 & -\frac{1}{4}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -E & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}B & \frac{1}{4}B \\ \frac{1}{4}B & -\frac{1}{4}B \end{pmatrix} = \frac{1}{4}A$$

方法③: $\because A^2 = 4A \quad \therefore A^{-1} = \frac{1}{4}A$

P203. T29:

$$\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -A & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & B \\ 0 & E_n - AB \end{pmatrix}, \text{即} \quad \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ A & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m - BA & B \\ 0 & P \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_m||E_n - AB| = |E_n - AB| = |E_m - BA||E_n| = |E_m - BA|$$

$$\text{P203. T30} \quad \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{pmatrix} \text{则} \quad \begin{pmatrix} \lambda E_m & 0 \\ -A & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda E_n & \lambda B \\ 0 & \lambda E_n - \lambda B \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \text{又} \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda E_m & 0 \\ -A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda E_m - \lambda B & B \\ 0 & \lambda E_n \end{pmatrix} \\
& \therefore \lambda_m |\lambda E_n - AB| = |\lambda E_n \|\lambda E_n - AB| = \begin{vmatrix} \lambda E_m & \lambda B \\ 0 & \lambda E_m - \lambda B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_m & 0 \\ -A & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{vmatrix} \\
& = \begin{vmatrix} \lambda E_m - BA & B \\ 0 & \lambda E_n \end{vmatrix} = |\lambda E_m - BA \|\lambda E_n| = |\lambda E_m - BA|
\end{aligned}$$

第五章 二次型习题解答

P232. T1

(I) ②) 化标准形, $f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$

$$\begin{aligned}
\text{解: } f &= (x_1+x_2)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2 \\
&= (x_1+x_2)^2 + (x_2+2x_3)^2 + 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\text{则 } f = y_1^2 + y_2^2$$

$$\begin{aligned}
& \text{用矩阵验算} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(I) ③) 化标准形 $f = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$

$$\begin{aligned}
\text{解: } f &= (x_1-x_2+x_3)^2 - (x_2-x_3)^2 - 3x_2^2 - 6x_2x_3 \\
&= (x_1-x_2+x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2 \\
&= (x_1-x_2+x_3)^2 - (2x_2+x_3)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{3}{2}y_3 \\ x_2 = \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\text{则 } f = y_1^2 - y_2^2$$

$$\text{验算有: } \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(I) ④化标准形 $f=8x_1x_4+2x_3x_4+2x_2x_3+8x_2x_4$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_4 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \\ x_4 = y_1 - y_4 \end{cases} \quad \text{则 } x = c_1 y q$$

$$f = 8(y_1^2 - y_4^2) + 2y_3(y_1 - y_4) + 2y_2y_3 + 8y_2(y_1 - y_2)$$

$$= 8y_1^2 - 8y_4^2 + 8y_1y_2 + 2y_1y_3 + 2y_2y_3 - 8y_2y_4 - 2y_3y_4$$

$$\begin{aligned} \therefore f &= 8(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3)^2 - 8(\frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3)^2 - 8y_4^2 + 2y_2y_3 - 8y_2y_4 - 2y_3y_4 \\ &= 8(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3)^2 - 2(y_2 - \frac{1}{4}y_3 + 2y_4) + 2(-\frac{1}{4}y_3 + 2y_4) - \frac{1}{8}y_3^2 - 8y_4^2 - 2y_3y_4 \\ &= 8(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3)^2 - 2(y_2 - \frac{1}{4}y_3 + 2y_4)^2 - 4y_3y_4 \\ &= 8(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3)^2 - 2(y_2 - \frac{1}{4}y_3 + 2y_4)^2 + (y_3 - y_4)^2 - (y_3 + y_4)^2 \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{8}y_3 \\ z_2 = y_2 - \frac{1}{4}y_3 + 2y_4 \\ z_3 = y_3 - y_4 \\ z_4 = y_3 + y_4 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} y_1 = z_1 - \frac{1}{2}z_2 - \frac{5}{8}z_3 + \frac{3}{8}z_4 \\ y_2 = z_2 + \frac{9}{8}z_3 - \frac{7}{8}z_4 \\ y_3 = \frac{1}{2}z_3 + \frac{1}{2}z_4 \\ y_4 = -\frac{1}{2}z_3 + \frac{1}{2}z_4 \end{cases}$$

则 $f = 8z_1^2 - 2z_2^2 + z_3^2 - z_4^2$

矩阵验算略

(I) ⑤化标准形 $f=x_1x_2+x_1x_3+x_1x_4+x_2x_3+x_2x_4+x_3x_4$

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

解:

$$\begin{array}{c}
\left(\begin{array}{c} A \\ E \end{array} \right) \xrightarrow{P_{i(2)}} \left(\begin{array}{cccc} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 4 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \\ 2 & -1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \\
\rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \quad X = \left(\begin{array}{cccc} 2 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) y \\
\therefore
\end{array}$$

则 $f = 4y_1^2 - y_2^2 - 4y_3^2 - 3y_4^2$

(I) ⑦化标准形 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_4$

$$A = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\left(\begin{array}{c} A \\ E \end{array} \right)} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

解:

$$\xrightarrow{P(3,(-1))} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{即令 } X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} Y$$

$$\text{则 } f = y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2 + y_4^2$$

P233,T2

设秩 $(A) = r$, 则存在 C 满秩

$$C'AC = D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^r d_i E_{ii}$$

那么, $d_1 E_{11}, d_2 E_{22}, \dots, d_r E_{rr}$ 的秩都等于 1, 且为对称的。

$$\therefore A = (c')^{-1} \left(\frac{r}{z} d_i E_{ii} \right) C^{-1}$$

$$A = (C')^{-1} \left(\sum_{i=1}^r d_i E_{ii} \right) C^{-1}$$

$$= (C^{-1})' \left(\sum_{i=1}^r d_i E_{ii} \right) C^{-1} = \sum_{i=1}^r B_i$$

$$\text{其中 } B_i = (c^{-1})' (d_i E_{ii}) c^{-1}$$

$$\text{秩}(B_i) = \text{秩}(d_i E_{ii}) = 1, \quad B_i' = (c^{-1})' (d_i E_{ii})' (c^{-1})' = B_i$$

$\therefore A$ 为 r 个秩为 1 的, 对称阵之和。

P233. T3

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \lambda_{i1} & & & \\ & \lambda_{i2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{in} \end{pmatrix}$$

$$\text{证明一: 设 } A = \sum_{i=1}^n \lambda_i E_{ii} \quad B = \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} E_{ij}$$

$$\text{又 } i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 为 } 1, 2, \dots, n \text{ 的一个排列, 所 } A = \sum_{j=1}^n \lambda_{i_j} E_{i_j i_j}$$

考慮标准单位向量 e_1, e_2, \dots, e_n 作 $C = (e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{in})$ 则 C 的 n 列线性无关, C 可逆, 且

$$\begin{aligned}
C &= \sum_{j=1}^n E_{i_j j}, C' = \sum_{j=1}^n E_{j i_j} \\
C' A C &= (\sum_{j=1}^n E_{j i_j}) (\sum_{k=1}^n \lambda_{i_k} E_{i_k i_k}) (\sum_{l=1}^n E_{i_l l}) \\
&= (\sum_{j=1}^n \lambda_{i_j} E_{j i_j}) (\sum_{l=1}^n E_{i_l l}) \\
&= \sum_{j=1}^n \lambda_{i_j} E_{j j}
\end{aligned}$$

故 A 与 B 合同

△证法二（归纳法） n=1, 显然, 设 n-1 时命题成立。

考虑 n 情形, 设 $i_k = n$

1. 若 $k=n$, 则 i_1, \dots, i_{n-1} 为 1, 2, ..., n-1 的一个排列, 所以

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} &\simeq \begin{pmatrix} \lambda_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{in} \end{pmatrix} \\
p'(i_k, n) \begin{pmatrix} \lambda_i & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{i+1} \end{pmatrix} P(i_k, n) &= \begin{pmatrix} \lambda'_{i-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda'_{in-1} \end{pmatrix} = B_1
\end{aligned}$$

2. 若 $k < n$,

而 $i_1 \dots i'_{n-1}$ 为 1, 2, ..., n-1 的一个排列, 所以

$$\begin{aligned}
C'_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{n-1} \end{pmatrix} C_1 &= \begin{pmatrix} \lambda'_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda'_{in-1} \end{pmatrix} \\
\therefore \begin{pmatrix} C'_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \lambda'_i & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda'_{in-1} \end{pmatrix} = B_1 (\because \lambda_n = \lambda_{ik})
\end{aligned}$$

$$\therefore A \simeq B_1, B \simeq B_1, \therefore A \simeq B$$

由归纳原理, 证明完毕。

$P_{233} 4(1) \Rightarrow$ 若 $A' = A$, 要 $X : a = X' A X = X' A X'' = X'(-A)X = -a$

$\therefore a = 0$, 即 $X, X' A X = 0$

4(2) 令 $X = \varepsilon_i$, 则 $f(\varepsilon_i) = 0 = \varepsilon_i' A \varepsilon_i = a_{ii}$, 即 $a_{ii} = 0$

又令 $X = \varepsilon_i + \varepsilon_j$ 则 $f(\varepsilon_i + \varepsilon_j) = a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} = a_{ij} + a_{ji} = 0$

$\therefore a_{ij} = -a_{ji}$, 故 $A' = -A$, 证毕.

若 $A' = A$, 则 $a_{ij} = a_{ji}$

\therefore 作 $f(x) = X' A X$, $f(\varepsilon_i) = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$

又 $f(\varepsilon_i + \varepsilon_j) = 0 = a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} = 2a_{ij}$ 即 $a_{jj} = 0$

$$4(2) \therefore A = 0$$

P233. T5

设实对称矩阵A,B秩为 r_A, r_B ,正惯性指数为 P_A, P_B

$$\therefore A \simeq B \Leftrightarrow r_A = r_B \text{ 且 } p_A = p_B$$

$\because 0 \leq p \leq r$, 当 $r = 0$ 时 \nexists 只有 $p = 0$ 此1类

当 $r = 1$ 时 \nexists 有 $p = 0, 1$, 此2类

当 $r = 2$ 时 \nexists 有 $p = 0, 2$, 此3类

当 $r = n$ 时 \nexists 有 $p = 0, 1, 2, \dots, n$, 此 $n+1$ 类

$$\text{共有 } 1 + 2 + \dots + (n+1) = C_{n+2}^2 = \frac{1}{2}(n+1)(n+2) \text{ 类}$$

P233.6 " \Leftarrow " $f = X'AX$, ①若 f 的秩 = 1, 则 $X = C_1Y, C_1$ 可逆. 使

$f = d_1y_1^2 = (dy_1) \bullet y_1$, 其中 dy_1, y_1 都是一次齐次多项式
若

f 的秩 = 2. 符号差 = 0. 则 $X = C_2y, (C_2$ 可逆) 使

$f = d_1y_1^2 - d_2y_2^2, (d_1, d_2 > 0) = (\sqrt{d}_1y_1 + \sqrt{d}_2y_2)(\sqrt{d}_1y_1 - \sqrt{d}_2y_2)$ 其中 $\sqrt{d}_1y_1 + \sqrt{d}_2y_2, \sqrt{d}_1y_1 - \sqrt{d}_2y_2$
都是 x_1, x_2, \dots, x_n 的齐次一次式.

" \Rightarrow " 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)(b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n)$

若 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 线性无关, 不妨设 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$

令 $\left\{ \begin{array}{l} y_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \\ y_2 = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n \\ \dots \\ y_i = x_i \end{array} \right\}$ 则 $f = y_1y_2$

令 $\left\{ \begin{array}{l} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_1 - z_2 \\ \dots \\ y_i = z_i \end{array} \right\}$ 则 $f = z_1^2 - z_2^2$, 秩为2 符号差 = 0

若 α, β 线性相关, 不妨设 $\beta = k\alpha$ 及 $a_1 \neq 0$, 令 $\left\{ \begin{array}{l} y_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \\ y_2 = x_2 \\ \dots \\ y_n = x_n \end{array} \right\}$

则 $f = ky_1^2$, 秩为1

$$P_{233} 7(1) A = \begin{pmatrix} 99 & -6 & 24 \\ -6 & 10 & -30 \\ 24 & -30 & 71 \end{pmatrix}$$

$$p_1 = 99 > 0, p_2 = 12834 > 0, p_3 = 20 - 672 - 672 - 288 - 16 - 1960 = -3588 < 0$$

$\therefore A$ 正定, 二次型也正定.

$$(2) A = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 12 \\ 4 & 2 & -14 \\ 12 & -14 & 1 \end{pmatrix}$$

$$p_1 = 10 > 0, p_2 = 20 - 16 = 4 > 0, p_3 = 20 - 672 - 288 - 16 - 1960 = -3588 < 0$$

$\therefore A$ 非正定, 二次型 $X'AX$ 非正定

$$(3) \text{判定 } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \text{ 的正定性}$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{解 } P_k = \frac{1}{2^k} \begin{vmatrix} 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dots & \dots & 2 \end{vmatrix}_{k\text{阶}} = \frac{1}{2K} (2-1)(2+(K-1)) = \frac{K+1}{2K} > 0$$

由公式

故 A 正定, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定

这里顺便发现一个等式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

P₂₃₃.7④

判别 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$, 是否正定。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \dots & \dots & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \dots & \dots \\ \dots & \frac{1}{2} & 1 & \dots & \frac{1}{2} \\ 0 & \dots & \dots & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

证:

$$\text{由斜行列式, } P_k = p_k - 1 - \frac{1}{4}p_{k-1} - 2, \therefore P_k - \frac{1}{2}P_{k-1} = \frac{1}{2}(p_{k-1}) \frac{1}{2^{n-1}}(p_1 - \frac{1}{2}p_0) = \frac{1}{2^k}$$

$$\therefore \frac{1}{2}(P_{k-1} - \frac{1}{2}P_{k-1}) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2^{n-1}}) = \frac{1}{2^k}$$

$$\therefore \frac{1}{2^{k-2}}(P_2 - \frac{1}{2}P_1) = \frac{1}{2^k}$$

$$\therefore P_k = \frac{1}{2^{k-1}}P_1 = \frac{k-1}{2^k} \quad \therefore P_k = \frac{k+1}{2^k} > 0, k=1,2,\dots,n$$

$\therefore A$ 正定 $C(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定

$$P_{233} \cdot 8(1)A = \begin{pmatrix} 1 & t & 12 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$p_1 = 1 > 0, p_2 = 1 - t^2 > 0, p_3 = 5 - 4t - 1 - 5t^2 = 4t - 5t^2 > 0$$

$$\therefore -1 < t < 1 \text{ 且 } -\frac{4}{5} < t < 0, \text{ 即 } -\frac{4}{5} < t < 0$$

\therefore 当 $-\frac{4}{5} < t < 0$ 时, A 为正定, 相应二次型也正定.

$$P_{233} \cdot 8 \cdot {}_{(2)}x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & 5 \\ t & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

解:

$$P_1 = 1 > 0, P_2 = 4 - t^2 > 0, \therefore t^2 < 4, \therefore -2 < t < 2$$

$$P_3 = 4 + 30t - 100 - 9 - t^2 > 0, \text{ 即 } t^2 - 30t + 105 < 0 \text{ 又因为 } 15 - 2\sqrt{30} < 15 - 2 \times 6 = 3 > 2$$

\therefore 无公共解

即对任何 t 都有主子式大于 0

P₂₃₃.9. A正定 \Leftrightarrow A的主子式全大于0.

证明: \Leftarrow 此时A的顺序主子式也大于0。所以A正定(定理)

\Rightarrow 任取的*i₁*, *i₂*, ..., *i_k*行, *i₁*, *i₂*, ..., *i_k*列作成一个k阶主子式

$$B = \begin{pmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \dots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \dots & a_{i_2 i_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \dots & a_{i_k i_k} \end{pmatrix}, P = |B|$$

设 $f = X'AX$, 作一个关于, $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}$ 的二次型

$$g(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}) = f(0, \dots, 0, x_{i_1}, 0, x_{i_2}, 0, x_{i_k}, 0, \dots)$$

$$(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}) B \begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \dots \\ x_{i_k} \end{pmatrix}$$

B是g的矩阵, 因为任给($x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}$) $\neq 0$

$$\therefore g(c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_k}) = f(0, \dots, 0, c_{i_1}, 0, \dots, 0, c_{i_k}, 0, \dots) > 0$$

$\therefore B$ 为K的正定矩阵,*有 $|B| > 0$

证: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 那么 $tE + A$ 的第L个顺序主子式

$$\tilde{P}_R(t) = \begin{vmatrix} t + a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & t + a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & t + a_{kk} \end{vmatrix}, = t^k + b_{k1}t^{k-1} + \dots + b_{kk}$$

$$\lim \tilde{P}_k(t) = +\infty, \forall M > 0$$

是一个t的多项式(函数),且 $t \rightarrow \infty$

$\therefore \exists N_k$, 当 $t > N_k$ 后, 恒有 $\tilde{P}_k(t) > M > 0$

取 $N_0 = \min\{N_1, N_2, \dots, N_n\}$ 则当 $t > N_0$, 恒有

$$\tilde{P}_1(t) > 0, \tilde{P}_2(t) > 0, \dots, \tilde{P}_n(t) > 0$$

$tE + A$ 正定

P₂₃₃.11.A正定,证明A⁻¹正定

证: $\therefore A$ 可逆 CA 正定 \exists 存在C C^{-1} 逆使

$$C'AC = E$$

$$\therefore (C'AC)^{-1} = E^{-1} = E$$

$$C^{-1}A^{-1}(C')^{-1} = E, \text{ 取 } G = (C')^{-1}, \text{ 那么 } G' = ((C')^{-1})' = (C'')^{-1} = C^{-1}$$

即 $\therefore G'A^{-1}G = E$, 则 $A^{-1} \simeq E$, $\therefore A^{-1}$ 正定.

P_{234.12} 考虑($tE + A$), 因为 t 充分大后(10题P_{5.77.7.2}). $tE + A > 0$
 故可设 $t_0 > 0$, 且 $|t_0 E + A| > 0$. 又因为当 $t=0$ 时, $|A| < 0$ 所以
 $\varepsilon \in (0, t_0)$, $|\varepsilon E + A| = 0$, 所以有 $X \neq 0$, 使 $(\varepsilon E + A)X = 0$
 即 $X'(\varepsilon E + A)X = 0$. ($\because x \neq 0, \therefore x'x > 0, \varepsilon x'x > 0$). 得到 $X'AX = -\varepsilon X'X < 0$

P_{234.13} 证, 设 $f_1 = X'AX, f_2 = X'BX$
 则由A,B正定, 有 f_1, f_2 正定, 即要 $x \neq 0, X'AX > 0, X'BX > 0$

作 $f = f_1 + f_2 = X'(A+B)X$
 也有任 $X \neq 0, f = X'AX + X'BX > 0$

所以 f 正定, 即 $(A+B)$ 正定

P_{234.14} $f = X'AX \geq 0 \Leftrightarrow$ 秩 $r =$ 惯性指数 P

证: 设 $X=CY$, 使 $f = X'AX = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 + y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$

“充分性 \Rightarrow ”若 $P=r$, 则负系数平方项不出现

$X_0 = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \neq 0$, 必有 $y_0 = C^{-1}X_0$, f 在 X_0 的值为

$$\therefore f_1 x = x_0 = X_0'AX_0 = y_1^2 + \dots + y_r^2 \geq 0$$

任取 $\therefore f$ 半正定

$$p < r, \text{ 取 } y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_r, x_0 = cy_0 = \begin{pmatrix} c_{1r} \\ c_{2r} \\ \vdots \\ c_{nr} \end{pmatrix} \neq 0$$

“必要性 \Rightarrow ”, 反设

一方面, $f = X_0'AX_0 \geq 0$

$$f = X_0'AX_0 = y_0' \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & -1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & -1 & \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix} y_0 = -1 < 0$$

另一方面,

矛盾! $\therefore p = r$

P_{234.15}. 证明 $f = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{j=1}^n x_j \right)^2 \geq 0$

证法一: 因为 $f = \sum_{j=1}^n x_j^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_{ij}$

恰好有 $f = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$

故任取 $(c_1, c_2, \dots, c_n) \neq 0$, 必有

$$f(c_1, c_2, \dots, c_n) = \sum (c_i - c_j)^2 \geq 0$$

$\therefore f$ 半正定 B

$$f = X'AX, \text{ 则 } A = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & \dots & n-1 \end{pmatrix}$$

证法二: 设

因此 A 的任意 k 阶主子式为

$$Q_k = \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & n-1 & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & \dots & n-1 \end{vmatrix}_{k \times k} \Rightarrow (n-1)^{k-1} (n-1 + (k-1)(-1))$$

恒有 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{n-1} > 0, Q_n = 0$

$\therefore A$ 的所有主子式大于或等于 0 $\therefore f = X'AX$ 半正定

P234.1 证: 首先 x_1, x_2 线性无关,

(反设 x_1, x_2 线性相关, 不妨设有 $X_2 = kX_1, k \in R$)

$$\therefore X_2'AX_2 = (kx_1')A(kx_1) = k_2(x_1'Ax_1) > 0$$

与 $x_2'Ax_2 < 0$ 矛盾。

$$x(t) = x_1 + t(x_2 - x_1) = tx_2 + (1-t)x_1 \neq 0, (\text{对任何 } t)$$

\therefore 二次型 $f = x'Ax$ 在 $x(t)$ 的值为

$$q(t) = x'(t)Ax(t) = (tx_2' + (1-t)x_1')A(tx_2 + (1-t)x_1)$$

$$= (t(x_2' - x_1'))A(t(x_2 - x_1) + x_1)$$

$$= t_2(x_2 - x_1)'A(x_2 - x_1) - 2tx_1'A(x_2 - x_1) + x_1'Ax_1$$

$$\sigma(0) = x_1'Ax_1 > 0, \sigma(1) = x_2'Ax_2 < 0$$

是 t 的初等连续函数,

所有 t_0 , 使 $\phi(t_0) = 0$. 令 $x_0 = x(t_0) = x_1 + t_0(x_2 - x_1) \neq 0$.

则有 $x_0'Ax_0 = \phi(t_0) = 0$, 证毕。

P234 补 1 ① 化标准形. $f = x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \dots + x_nx_{n+1}$

$$\text{解 } \begin{cases} x_1 = y_1 + y_{2n} \\ x_2 = y_2 + y_{2n-1} \\ \dots \\ x_n = y_n + y_{n+1} \\ x_{n+1} = y_n - y_{n-1} \\ \dots \\ x_{2n-1} = y_2 - y_{2n-1} \\ x_{2n} = y_1 - y_{2n} \end{cases} \quad X = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & 1 \\ & 1 & & & & & & 1 \\ & & \dots & & & & & \dots \\ & & & 1 & 1 & & & \\ & & & & 1 & -1 & & \\ & & & & & \dots & & \\ & & & & & & 1 & -1 \\ 1 & & & & & & & -1 \\ & & & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

即

$$Y = cy \quad \text{则有}$$

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 - y_{n+1}^2 - \dots - y_{2n}^2$$

$$C' \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & 1 & \cdots & \\ & & 1 & \\ 1 & & & \end{pmatrix} \right) C = \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & -E_n \end{pmatrix}$$

验算

$$\text{令 } H = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \cdots & \\ 1 & & & \end{pmatrix}, \text{ 则 } H^2 = En, A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}H \\ \frac{1}{2}H & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} E & H \\ H & -E \end{pmatrix}$$

$$\therefore C' AC = \begin{pmatrix} E' & H' \\ H' & -E' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}H \\ \frac{1}{2}H & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & H \\ H & -E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & H \\ H & -E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E & -\frac{1}{2}H \\ \frac{1}{2}H & \frac{1}{2}E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -E \end{pmatrix}$$

$$\text{P234 补 1②化标准形 } f = x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n$$

$$\text{解: 若设 } y_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + x_3), y_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2 + x_3), \text{ 则}$$

$$y_1^2 - y_2^2 = x_1x_2 + x_2x_3$$

$$(1) \quad (1) \quad \text{若 } n \text{ 是偶数, 则} \quad \left\{ \begin{array}{l} y_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + x_3) \\ y_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2 + x_3) \\ y_3 = \frac{1}{2}(x_3 + x_4 + x_5) \\ y_4 = \frac{1}{2}(x_3 - x_4 + x_5) \\ \dots \\ y_{n-3} = \frac{1}{2}(x_{n-3} + x_{n-2} + x_{n-1}) \\ y_{n-2} = \frac{1}{2}(x_{n-3} - x_{n-2} + x_{n-1}) \\ y_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n) \end{array} \right\}$$

$$c_1 = \frac{1}{2} \left(\begin{array}{cc|cc|cc|cc} 1 & -1 & 1 & & & & & \\ 1 & -1 & 1 & & & & & \\ \hline & & 1 & 1 & 1 & & & \\ & & 1 & -1 & 1 & & & \\ \hline & & & & \dots & & & \\ & & & & & 1 & 1 & \\ & & & & & 1 & -1 & \\ \hline & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 1 & -1 \end{array} \right)$$

即, $Y = C_1 X$

显然 $|C_1| = \frac{1}{2^n} (-2)^{\frac{1}{2}} \neq 0$, 令 $C = C_1^{-1}$

则 $X = CY$ 使

$$f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \dots + y_{n-3}^2 - y_{n-2}^2 + y_{n-1}^2 - y_n^2$$

$\Delta(ii)$ 若 n 为奇数, 同理

补 P234.1③)(也可直接证明, 或归纳证明)

$$P234 \text{ 补 } 1.④ \quad f = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix} = y = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} n-1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \dots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & \dots & n-1 & -1 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} X = \frac{1}{n} C_3 X \Rightarrow X = \left(\frac{1}{n} c_3 \right)^{-1} y \\
& = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} y
\end{aligned}$$

令 .

$$\because y_i = x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = x_i - \bar{x}, y_n = x_n, \sum y_i = \sum x_i - (n-1)\bar{x} = \bar{x}$$

$$\therefore f = \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 + (x_n - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 + (y_n - \sum_{i=1}^n y_i)^2 = 2 \left(\sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} y_i y_j \right)$$

参照P234.1③(5.75.5.3)令

$$Z = C_4 Y = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{3} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \frac{1}{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} Y$$

$$\text{则 } f = 2z_1^2 + \frac{3}{2}z_2^2 + \frac{4}{3}z_3^2 + \dots + \frac{n}{n+1}z_{n-1}^2$$

$$\text{其中 } x = \left(\frac{1}{n} c_3 \right)^{-1} y = \left(\frac{1}{n} c_3 \right)^{-1} c_4^{-1} y = n(c_4 c_3)^{-1} y$$

矩阵验算略.

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0 \text{(左上角r阶子式)} \\
& \text{P234补2, 不妨设 秩(A)=r, 且}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \therefore \text{作 } X = C_1 Y, \text{ 其中 } C_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} & \dots & a_m \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{那么, } f = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2 + \delta_{r+1}^2 + \dots + \delta_s^2 (\delta_i \text{ 为 } y_1, \dots, y_r \text{ 的一次式})$$

作一个 $f_1(y_1, y_2, \dots, y_r) = f$ 被为 r 元二次型◆那么◆任取 $c_1, c_2, \dots, c_r \neq 0$
那么, 必有 $f_1(c_1, c_2, \dots, c_r) = f(c_1, \dots, c_r, 0) > 0, \therefore f_1$ 是一个 r 元正定二次型

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_r \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \dots \\ z_r \end{pmatrix} \text{ 使 } f_1(y_1, y_2, \dots, y_r) = c_1^2 + c_2^2 + \dots + z_r^2$$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G & o \\ o & E_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_r \\ \dots \\ z_n \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} G & o \\ o & E_{n-r} \end{pmatrix} \text{ 可逆}$$

$$\text{则 } f = y_1^2 + \dots + y_r^2 + \delta_{r+1}^2 + \dots + \delta_s^2$$

$$\text{且 } X = C_1 Y = C_1 C_2 Z = CZ (C = C_1 C_2 \text{ 可逆} \blacklozenge)$$

必有 $\therefore f$ 的正惯性指数 $= r = \text{秩}(A)$

$$P_{234} \text{ 补 3(先讲补 2), } f = l_1^2 + \dots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2$$

$$\text{证: 设 } l_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$$

$$\text{并设 } X = CY, (C \text{ 可逆}) \text{ 使 } f = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{p'}^2 - y_{p'+1}^2 - \dots - y_{p'+q'}^2$$

$$p' > p \text{ 作线性方程组 } \left\{ \begin{array}{l} l_1 = 0 \\ \dots \\ l_p = 0 \\ \dots \\ y_{p'+1} = 0 \\ \dots \\ y_n = 0 \end{array} \right.$$

那么 反设

$$y_i = b_{i1}x_1 + \dots + b_{in}x_n$$

$$Y = C^{-1}X$$

共有 $p + (n - p') = n - (p' - p) < n$ 的方程

存在非零时,

$$X_0 = \begin{pmatrix} c_1 \\ \dots \\ c_n \end{pmatrix} \neq 0, y_0 = C^{-1}X_0 \neq 0, \therefore y_{p'+1} = \dots = y_n = 0 \therefore y_0 \text{ 的前 } p' \text{ 个分量不全为 } 0$$

$$\therefore \text{一方面 } f = -l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2 \leq 0$$

$$\text{另一方面 } f = y_1^2 + \dots + y_{p'}^2 > 0 (i \text{ 不全为 } 0)$$

矛盾, 所有 $p' \leq p$

同理,负惯性指数 $q' \leq q$

另推论:如本例形式二次型,例 $p+q \geq r$ (秩)

$$\begin{aligned} p_{235} \text{ 补4证明: } & \because T'AT = A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} E & X \\ o & E \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} E & X \\ o & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{11}X + A_{12} \\ A_{21} & A_{21} + A_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E & o \\ X & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{11}x + A_{12} \\ A_{21} & A_{21}x + A_{22} \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{11}x + A_{12} \\ x'A_{11} + A_{21} & * \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$A_{11}x + A_{12} = 0 \text{ 则 } x = -A_{11}^{-1}A_{12}, (\because A_{12} = A_{21})$$

$$\therefore x'A_{11} + A_{21} = (-A_{11}^{-1}, A_{11}^{-1})A_{11} + A_{21} = -A_{21}A_{11}^{-1}A_{11} + A_{21} = 0$$

设

$$T = \begin{pmatrix} E & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ o & E \end{pmatrix} \text{ 即合要求}$$

P₂₃₅, 补 5, 若 n=1, 显然 A=0

若 n=2, A=0, 显然

$$A \neq o, \text{ 则 } \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 成立}$$

【】

由于 A_2 仍为反对称

$$T'_2 A_2 T_2 = \left(\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & & & & \\ -1 & 0 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 0 & 1 & \\ & & & & -1 & 0 & \\ & & & & & 0 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 0 \end{array} \right)$$

故归纳假设 A_2 :

$$\therefore \text{取 } C = P_{(s,t)} P_{(t,2)} T \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & & \\ & 1 & \\ & & \dots \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2 & 0 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix} \text{ 则}$$

$$C'AC = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & \dots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & -1 & 0 & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \dots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

证毕.

P₂₃₅ 补, 6 由习题第 10 题(5.7.7.7.2), 一定存在 $C_1 > 0$, 当 $t > c_2$ 时
 $C_1 E - A$ 永为正定

$C > \max\{C_1, C_2\}$ 那么同时 $CE + A, CE - A$ 正定,

即要 $X_0 \neq 0, X_0'(CE + A)X_0 > 0 \Rightarrow 2CX_0'X_0 < X_0'AX_0$

$X_0'(CE - A)X_0 > 0 \Rightarrow CX_0'X_0 < X_0'AX_0$

即 $-CX_0'X_0 < X_0'AX_0 < CX_0'X_0$

取 \therefore 对每个 X , 有 $|X'AX| < CX'X$

$$P_{235} \text{ 补 7, 1) } \quad T = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \dots \\ & & 1 \\ & \dots & \dots \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}, B = T'AT$$

$T = \begin{pmatrix} T_1 & T_3 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2 & A_3 \end{pmatrix}$ 其中, T_1, A_1 为 K 阶方阵.
 将 T 分块

则 B 的第 K 个顺序主子式的矩阵为

$$T'AT = \begin{pmatrix} T_1' & 0 \\ T_3' & T_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2 & A_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 & T_3 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_1' & 0 \\ T_3' & T_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 T_1 & * \\ A_2 T_1 & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_1' A_1 T_1 & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

的左上角 k 阶方阵, 即为 $T_1' A_1 T_1$

$\therefore B$ 的第 k 个顺序主子式 $= |T_1' A_1 T_1| = |T_1|^2 |A_1| = |A_1|$, 为 A 的第 k 个顺序主子式. 证毕
 2) 归纳证明, $n=1$ 显然, 设 $n-1$ 成立, 考虑 n 情形

设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha' & a_{\cos} \end{pmatrix}$ 由 A_1 满足条件, 存在 T_1 特殊上三角, 使 $D_1 = T_1' A_1 T_1$ 为对角

设 $G = \begin{pmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 仍为特殊上三角 \Leftrightarrow 使 $G' A' G = \begin{pmatrix} D_1 & T_1' \alpha \\ \alpha' T_1 & a_{nn} \end{pmatrix} = B$

$\because |D_1| = |T_1|^2 |A_1| \neq 0 \therefore D_1$ 可逆,

又 $H = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -D^{-1} & T_1' \alpha \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 仍为特殊上三角, 且

$$H' B H = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha' T_1 D_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 & 0 \\ \alpha' \beta T_1 & a_{nn-x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = D$$

故取 $C = GH$ 仍为特殊上三角, 且 $C' AC = D$ 为对角, 证毕.

3)

$\because A$ 的顺序主子式 $P_1 \dots P_n$ 全大于 0, 故存在特殊上三角 T 使, $D = T' AT$ 为对角, 于是

D 与 A 的顺序主子式值相等, 设 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$

则 $d_1, d_2, \dots, d_k = p_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 推出 $d_1, d_2, \dots, d_n > 0$

所以 D 正定, 即 A 正定, 证毕.

$$f = \begin{vmatrix} A & y \\ y' & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & y \\ y' & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E & -A^{-1}y \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ y' & -y'A^{-1}y \end{vmatrix} = (-|A|) \cdot y'A^{-1}y$$

P236 补 8, 1),

$\because A$ 正定 i 已知 j . CA^{-1} 正定 i 见习题第 11 题 P5.76.6.4), 故对任一组 $y \neq 0$ 值.
 $y'A^{-1} > 0, \therefore f(y_1, y_2, \dots, y_n) = (-|A|) y'A^{-1} y < 0, (\because |A| > 0)$

$\therefore f$ 是负定二次型

$$\text{2) 设 } A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha' & a_{nn} \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} A_1 & \partial \\ \partial' & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ \alpha' & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\therefore |A| = |B_1| + |B_2| = (-|A_1|) \partial' A_1^{-1} \partial + a_{nn} |A_1| \leq a_{nn} |A_1| = q_{nn} p_{n-1}$$

$$\because A$$
 仍然证定 $.C|A_1| \leq a_{n-1, n-1} p_{n-1}$

$$\text{如此下去 } \text{4) } |A| \leq a_{nn} p_{n-1} \leq a_{nn} q_{n-1, n-2} \leq a_{nn} \dots a_{33} a_{22} p_1 = a_{nn} \dots a_{22} a_{11}$$

3) 即 $|A| \leq a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$

$$\text{作 } A = T' T = T' E T, \text{ 则 } A \text{ 正定且 } a_{ii} = \sum_{k=1}^n t_{ki}^2$$

$$\text{4) } \therefore |A| = |T|^2 \leq \prod_{i=1}^n a_{ii} = \prod_{i=1}^n \sum_{k=1}^n t_{ki}^2 = \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \dots + t_{ni}^2).$$

P_{236} 补9 (必要性)

$$A \geq 0 \Rightarrow C \text{ 可逆}, C'AC = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix} \geq 0 \therefore di \geq 0$$

$$\therefore |C|^2 |A| = d_1 d_2 \cdots d_n \geq 0 \therefore |A| \geq 0.$$

作 $g(x_{i_1}, \dots, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}) = f(0 \dots x_{i_1}, \dots, 0 x_{i_2}, \dots, x_{i_k} 0)$

$$\text{则 } g(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \text{ 半正定, } g \text{ 的矩阵为 } \begin{pmatrix} a_{i_1 i_1} & \dots & a_{i_1 i_k} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i_k i_1} & \dots & a_{i_k i_k} \end{pmatrix} = A_1$$

$$\therefore A_1 \geq 0 \therefore |A_1| \geq 0$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11+\lambda} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22+\lambda} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn+\lambda} \end{vmatrix} = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_k \lambda^{n-k} + \dots + a_n \text{ 中 } \lambda^{n-k} \text{ 的系数 } a_k$$

这样取到在 0 中主对角线上任取 $n-k$ 项中的 λ^{n-k} 的系数 a_k 项所在的行和列, 得一个 K 级子式
(含入) DK , 由于是 λ^{n-k} 的系数 故 K 的子式 D 中只能取所有的常数项 即令
 DK 中的 $\lambda = 0$, 这正是 D 的一个 K 级主子式, 要是 λ^{n-k} 的系数中的一元, 故 a_k 为 D 的所
有 k 阶主子式之和, 如

$$a_1 = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} \text{ 等.}$$

现在考虑任意 $\varepsilon > 0$, $A + \varepsilon E$, 它的 m 阶顺序主子式, 为 A 的右上角的 m 阶方阵, A_r 作:

$$|A_k + \varepsilon E_k| = \varepsilon^k + b_1 \varepsilon^{k-1} + \dots + b_k$$

由于 ε^{k-i} 的系数 b_i 是 A_k 的一切 i 阶主子式之和, 而 A_k 的主子式仍为 A 的主子式,

由充分条件, $b_i \geq 0, \therefore |A_k + \varepsilon E_k| \geq \varepsilon_k > 0$

因此 $A + \varepsilon E$ 正定, 故对任何 $X \neq 0, X'(A + \varepsilon E)X > 0$

$$\therefore \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} X'(A + \varepsilon E)Z = X'AX \geq 0 \text{ (边续性)}$$

所以 A 半正定.

第六章 线性空间习题解答

P267.1 设 $M \subseteq N$, 证明: $M \cap N = M, M \cup N = N$

证: $\forall x \in M \Rightarrow x \in N = M \Rightarrow x \in M \cap N \Rightarrow M \subseteq M \cap N$

$\forall x \in M \cap N \Rightarrow x \in M \Rightarrow M \cap N \subseteq M, \therefore M \cap N \subseteq M$

$$\therefore M \cap N = M$$

$\forall \forall x \in N \Rightarrow x \in M \cup N \Rightarrow N \subset M \cup N$

$\forall x \in M \cup N \Rightarrow x \in N \text{ 或 } x \in M \subseteq N \Rightarrow x \in N$

$\therefore M \cup N = N$

P267.2 证: ① $M \cap (N \cup L) = (M \cap N) \cup (M \cap L)$

② $M \cup (N \cap L) = (M \cup N) \cap (M \cup L)$

①:

证(1): $x \in \text{左} \Leftrightarrow x \in M \text{ 且 } x \in N \cup L \Leftrightarrow x \in M \text{ 且 } (x \in N \text{ 或 } x \in L) \Leftrightarrow x \in M \cap N \text{ 或 } x \in M \cap L \Leftrightarrow x \in \text{右} \Rightarrow \text{反过来。证毕}$

证(2): $x \in \text{左} \Leftrightarrow x \in M \text{ 或 } x \in N \cap L \Leftrightarrow x \in M \text{ 或 } (x \in N \text{ 且 } x \in L)$

$\Leftrightarrow x \in M \cup N \text{ 且 } x \in M \cup L \Leftrightarrow x \in \text{右} \Rightarrow \text{证毕}$

P267.3 ①不做成,因为 2 个 n 次多项式相加不一定是 n 次多项式,如

$$(x^u + x + 1) + (-x^u + x - 2) = 2x - 1$$

$$f(A) + g(A) = h_1(A), (h_1(x) = f(x) + g(x) \text{ 为多项式})$$

②做成,因为 $kf(A) = h_2(A), (h_2(x) = kf(x) \text{ 为多项式})$

做成. 因为实对称(反对称, 上三角, 下三角)之和之倍数仍为实对称

③(反对称, 上三角, 下三角)故做成线性空间

④不做成,设 $V = \{\alpha \mid \alpha \text{ 为平面上不平行 } \beta \text{ 的向量}\}$

⑤不做成,违反定义 3.5: $1\alpha = \alpha$, 但这里 $1\alpha = 0$ 。取 $\alpha \neq 0$ 即得矛盾。

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2)$$

$$k \circ (a_1, b_1) = (ka_1, kb_1 + \frac{1}{2}k(k-1)a_1^2)$$

P267.3 ⑤
解: 显然 V 非空 1⁰

以及 2 个封闭的代数运算 2⁰

验证 3⁰ 先设 $\alpha = (a_1, b_1), \beta = (a_2, b_2), r = (a_3, b_3)$, 及 $k, t \in R$

$$(1) \alpha \oplus \beta = \beta \oplus \alpha = (a_2 + a_1, b_2 + b_1 + a_2 a_1)$$

$$(2) (\alpha \oplus \beta) + r = ((a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2 + a_1 a_2) + b_3 + (a_1 + a_2) a_3)$$

$$\dots \dots \dots = (a_1 + a_2 + a_3, b_1 + (b_2 + b_3 + a_2 a_3) + a_1 a_2)$$

$$\dots \alpha \oplus (\beta \oplus r) = (a_1 + (a_2 + a_3), b_1 = (b_2 + (b_3 + a_2 a_3) + a_1 a_2) + a_1 (a_2 + a_3))$$

$$\dots \dots \dots = (a_1 + a_2 + a_3, b_1 + b_2 + b_3 + a_2 a_3 + a_1 a_2 + a_1 a_3) = (\alpha + \beta) + r$$

$$(3) 0 = (0, 0), \alpha + 0 = (a_1 + 0, b_1 + 0 + a_1 0) = (a_1, b_1) = \alpha$$

$$(4) \alpha \text{ 的负为 } -\alpha = (-a_1, a_1^2 - b_1)$$

$$\dots \dots \alpha \oplus (-\alpha) = a_1 + (-a_1), b_1 + (a_1^2 - b_1) + a_1(-a_1) = (0, 0) = 0$$

$$(5) 1 \circ \alpha = (1 \circ a_1, 1 \circ b_1 + \frac{1}{2}1 \circ (1-1)a_1^2) = (a_1, b_1) = \alpha$$

$$(6) k \circ (l \circ \alpha) = k \circ (la_1, lb_1 + \frac{1}{2}l(l-1)a_1^2)$$

$$\dots \dots \dots = (kla_1, kb_1 + \frac{1}{2}k(k-1)a_1^2) + \frac{1}{2}k(k-1)(la_1)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (kla_1 + klb + \frac{1}{2}kla_1^2(l-1+(k-1)) \\
&= (kla_1, klb) + \frac{1}{2}kl((k-1)a_1^2) \\
&= kl \circ \alpha \\
&\quad (7)(k+l) \circ \alpha = ((k+1)a_1, (k+l)b_1 + \frac{1}{2}(k+l)(k+l-1)a_1^2) \\
&\quad = ((k+1)a_1, (k+l)b_1 + \frac{1}{2}(k^2 + l^2 + 2kl - k - l)a_1^2) \\
&= (ka_1 + la_1, kb_1 + \frac{1}{2}k(k-1)a_1^2 + (b_1 + \frac{1}{2})l(l-1)a_1^2 + ka_1 \cdot la_1) \\
&= k \circ \alpha \oplus l \circ \alpha \\
&\quad (8) \\
&k \circ (\alpha \oplus \beta) = k \circ (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2) = (k(a_1 + a_2), k(b_1 + b_2 + a_1 a_2 + \frac{1}{2}k(k-1)(a_1 + a_2)^2)) \\
&= (ka_1 + ka_2, kb_1 + \frac{1}{2}k(k-1)a_1^2 + kb_2 + \frac{1}{2}k(k-1)a_2^2 + ka_1 a_2 + k(k-1)a_1 a_2) \\
&= (ka_1 + ka_2, (kb_1 + \frac{1}{2}k(k-1)a_1^2) + (kb_2 + \frac{1}{2}k(k-1)a_2^2 + (k^2 a_1 a_2))) \\
&= (ka_1, kb_2 + \frac{1}{2}k(k-1)a_1^2) \oplus (ka_2, kb_2 + \frac{1}{2}k(k-1)a_2^2) = \alpha \oplus \beta
\end{aligned}$$

满足 3, 故 \mathbf{V} 是一个线性空间

不做成。违反分配律, $\forall \alpha \neq 0$, 则会有 $\alpha = 2 \cdot \alpha = (1+1) \cdot \alpha = 1 \cdot \alpha + 1 \cdot \alpha = \alpha + \alpha$

⑥ $\Rightarrow \alpha = 0$, 矛盾

$$P_{267,3} \textcircled{8} V = R^+ \quad P = R \quad a \oplus b = ab \quad k \circ a = a^k$$

解: V 非是 ① 关于 \oplus 封闭 ②

任取 $a, b, c \in R^+, k, l \in R$

$$(1) a \oplus b = b \oplus a = ba$$

$$(2) (a \oplus b) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (b \oplus c)$$

$$(3) \text{零元 } 0 = I, a \oplus 0 = a \cdot I = a$$

$$(4) \text{负元 } -a = a, a \oplus (-a) = a \cdot a = 1 = 0$$

$$(5) I \circ a = a^I = a$$

$$(6) k \circ (l \circ a) = k \circ (a^l) = (a^l)^k = a^{lk} = (lk) \circ a$$

$$(7) (k+l) \circ a = a^{(k+l)} = a^k \cdot a^l = a^k \oplus a^l = k \circ a \oplus l \circ a$$

$$(8) k \circ (a \oplus b) = k \circ (ab) = (ab)^k = a^k b^k$$

$$= a^k \oplus b^k = k \circ a \oplus k \circ b$$

都成立, 故 R^+ 关于 \oplus 做成 R 上的向量空间

$$P_{268,4} \textcircled{1} k \cdot 0 = 0$$

$k0 = \alpha$, 则 $\alpha = k0 = k(0+0) = k0+k0 = \alpha + \alpha$

证: 设 $\therefore \alpha = \alpha + (-\alpha) = 0$

即 $k0=0$

$$4② k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta$$

$$\because 0 = \alpha + (-\alpha) = \alpha + (-1)\alpha = [1 + (-1)]\alpha = 0 \cdot \alpha = 0$$

$$\therefore (-1)\alpha = -\alpha$$

$$\begin{aligned} \text{故 } k(\alpha - \beta) &= k(\alpha + (-1)\beta) = k\alpha + k(-1)\beta = k\alpha + (-1)(k\beta) \\ &= k\alpha + (-k\beta) = k\alpha - k\beta \end{aligned}$$

P_{268.5} 实函数空间 F 中, 0 是 0 函数 0(x), $\forall x \in$ 定义域 O(x)=0,

于是 $k \cdot 1 + l \cdot \cos^2 t + m \cdot \cos 2t$

$$= k \cdot 1 + l \cos^2 t + m(2 \cos^2 t - 1)$$

$$= (k-m) \cdot 1 + (l+2m) \cos^2 t$$

可取, m=1, k=1, l=-2, 则

$$1 \cdot 1 + (-2) \cos^2 t + 1 \cdot \cos 2t = 0 \cdot (x)$$

$\therefore 1, \cos^2 t, \cos 2t$ 线性相关

P_{268.6} 在 P[x] 中, 0 元是 0 多项式(即系数全为 0 的多项式)

证: $\because (f_1, f_2, f_3) = 1, (f_1, f_2) \neq 1, (f_2, f_3) \neq 1, (f_3, f_1) \neq 1,$

设 $a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + a_3 f_3(x) = 0$, 不妨设 $a_1 \neq 0$

$$\therefore f_1(x) - \left(-\frac{a_2}{a_1}\right) f_2(x) + \left(-\frac{a_3}{a_1}\right) f_3(x)$$

$\because (f_2, f_3) \neq 1$, 被 $(f_2(x), f_3(x)) = d(x)$,

那么 $d(x)$ 整除 f_2, f_3 的组合, 故 $d(x) | f_1(x)$, 于是有

$$d(x) | (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$$

与 $(f_1, f_2, f_3) = 1$ 矛盾!

P268,7 ① $\varepsilon_1 = (1, 1, 1, 1), \varepsilon_2 = (1, 1, -1, -1), \varepsilon_3 = (1, -1, 1, -1), \varepsilon_4 = (1, -1, -1, 1), \xi = (1, 2, 1, 1)$

设 $\xi = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + x_3 \varepsilon_3 + x_4 \varepsilon_4$ 得方程解

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \because A^2 = 4E \\ \therefore A^{-1} = \frac{1}{4}A \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}$$

坐标为 $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$

$P_{268} \cdot 7. (2) \varepsilon_1 = (1, 1, 0, 1), \varepsilon_2 = (2, 1, 3, 1), \varepsilon_3 = (1, 1, 0, 0), \varepsilon_4 = (0, 1, -1, -1), \xi = (0, 0, 0, 1)$

设 $\xi = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + x_3 \varepsilon_3 + x_4 \varepsilon_4$, 得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = x_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

唯一解得 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = -1, x_4 = 0$

$\therefore \xi = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$

在此基下的 坐标为 $(1, 0, -1, 0)$

$P_{268} \cdot 8 \textcircled{1} P^{n \times n}$ 的一组是 $E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$, 共有 n^2 个(矩阵)元素

它们线性无关 $\because \sum_{i,j=1}^n a_{ij} E_{ij} = 0 \Rightarrow A = (a_{ij}) = 0 \Rightarrow \forall i, j, a_{ij} = 0$

且任何 $B = (b_{ij}) \in P^{n \times n}$, 则 $B = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} E_{ij}$

$\dim P^{n \times n} = n^2$, 它的一个基是 $E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$

$8 \textcircled{2} P^{n \times n}$ 中全体对称矩阵集合 $S(P)$, 它的一个基是 $E_{ij} + E_{ji}, i \leq j$

$$\dim S(P) = \frac{1}{2} n(n+1)$$

$P^{n \times n}$ 中全体对称矩阵集合 $K(P)$, 它的一个基是 $E_{ij} - E_{ji}, i < j$

$$\dim K(P) = \frac{1}{2} n(n-1)$$

$P^{n \times n}$ 中全体上 三角矩阵集合 $U(T)$, 它的一个基是 $E_{ij}, i \leq j$

$$\dim U(T) = \frac{1}{2} n(n+1)$$

$P^{n \times n}$ 中全体真下三角矩阵集合 $D^+(T)$, 它的一个基是 $E_{ij}, i > j$

$$\dim D(T) = \frac{1}{2}n(n-1)$$

8②中, θ , 零元是 1, 取一个 $a > 0, a \neq 1$, 则 $a \in IR^+$

$$\text{那么 } \forall b \in R^+, \text{ 取 } k = \log_a b (\because b = k \circ a = a^k \Rightarrow \lg b = k \cdot \lg a) \\ \therefore b = (\log_a b) \circ a = a^{\log_a b}$$

所以 a 是 R^+ 的一个基 $\dim_R R^+ = 1$

$$P_{268}.8(4), V = \left\{ f(A) \mid f(x) \in R[x], A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \omega & \\ & & \omega^2 \end{pmatrix}, \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \right\}$$

解: 因为 $\omega^3 = 1$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \omega^2 & \\ & & \omega^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \omega^2 & \\ & & \omega \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = E$$

所以 $f(x) \in R[x], f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$

则 $f(A) = (a_0 + a_3 + a_6 + \dots)E + (a_1 + a_4 + a_7 + \dots)A + (a_2 + a_5 + a_8 + \dots)A^2$

故 $f(A) = b_0E + b_1A + b_2A^2$

$\therefore E, A, A^2$ 可表示 V 中所有元素。

$$xE + yA + zA^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + \omega^1 y + \omega^2 z = 0 \\ x + \omega^2 y + \omega z = 0 \end{cases}$$

如果

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{vmatrix} = 3(\omega^2 - \omega) \neq 0, \text{ 所以 } x = y = z = 0 \text{ 只有零解}$$

\therefore 系数行列式

即, E, A, A^2 线性无关, 由定理 1

$\dim V = 3$, 它的一个基是 E, A, A^2

P269.9 ① $\varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0), \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1), \xi = (x_1, x_2, x_3, x_4)$

$$\eta_1 = (2, 1, -1, 1), \eta_2 = (0, 3, 1, 0), \eta_3 = (5, 3, 2, 1), \eta_4 = (6, 6, 1, 3),$$

$$\xi = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + x_3\varepsilon_3 + x_4\varepsilon_4$$

$$\therefore \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4 \rightarrow \eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \quad y = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)Ay$$

$$y = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/9 & 1/3 & -1 & -1/9 \\ 1/27 & 4/9 & 1/3 & -23/27 \\ 1/3 & 0 & 0 & -2/3 \\ -7/27 & -1/9 & 1/3 & -6/27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

\therefore 坐标 y 为

(A^{-1} 计算附下页)

$$(A, E) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & -2 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & -9 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -6 & 2 & 1 & -3 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -9 & 2 & 1 & -3 & -8 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -27 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc} 2 & 1 & -3 & -7 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 3 & 8 \\ 7 & 3 & -9 & -26 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 4/9 & 1/3 & -1 & -11/9 \\ 1/27 & 4/7 & -23/27 & -23/27 \\ 1/3 & 0 & -2/3 & -2/3 \\ -7/29 & -1/9 & 1/3 & 26/27 \end{array} \right)$$

P₂₆₉. 9. (2) 求由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4 \rightarrow \eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 并求多在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标.

$$\varepsilon_1 = (1, 2, -1, 0) \quad \eta_1 = (2, 1, 0, 1)$$

$$\varepsilon_2 = (1, -1, 1, 1) \quad \eta_2 = (0, 1, 2, 2)$$

$$\varepsilon_3 = (-1, 2, 1, 1) \quad \eta_3 = (-2, 1, 1, 2)$$

$$\varepsilon_4 = (-1, -1, 0, 1) \quad \eta_4 = (1, 3, 1, 2) \quad \xi = (1, 0, 0, 0)$$

解 $\because (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)T$ 因此.

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \xi) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)(T, X)$$

$$\therefore (T, X) = A^{-1}B$$

$$\therefore B = \left(\begin{array}{ccccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) = A \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) (T, X)$$

$$\therefore \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & -1 & -1 & 2 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 & -1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & -1 & -1 & 2 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 4 & 1 & -3 & 1 & 5 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 2 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & -2 & -2 & 1 & -2 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & 1 & -2 & -5 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 4 & 0 & 7 & 11 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & -12 & 1 & 0 & -12 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 1 & 1 & 6 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & 0 & 0 & -13 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3/13 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 5/13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2/13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3/13 \end{array} \right)$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

因此: 过渡矩阵

令 在 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \mathcal{E}_4$ 下的坐标为 $(\frac{5}{13}, \frac{5}{13}, -\frac{2}{13}, -\frac{3}{13})$

$$\text{P269.9 ③ } \mathcal{E}_1 = (1, 1, 1, 1), \mathcal{E}_2 = (1, 1, -1, -1), \mathcal{E}_3 = (1, -1, 1, -1), \mathcal{E}_4 = (1, -1, -1, 1)$$

$$\eta_1 = (1, 1, 0, 1), \eta_2 = (2, 1, 3, 1), \eta_3 = (1, 1, 0, 0), \eta_4 = (1, -1, -1, 1)$$

求 $\xi = (1, 0, 0, -1)$ 在 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的坐标

解 若 $(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \mathcal{E}_4)T = (\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \mathcal{E}_4)$ 那么

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{而 } \xi = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) y = (\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \mathcal{E}_4) x$$

$$= (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) T Y$$

$$\therefore Y = T^{-1} X \quad X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

不如直接解出

$$\xi = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) y \quad \therefore \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} -2 \\ -1/2 \\ 4 \\ -3/2 \end{pmatrix}}$$

故 $\xi = -2\eta_1 - \frac{1}{2}\eta_2 + 4\eta_3 - \frac{3}{2}\eta_4$ 在该基下坐标为 $\left(-2, -\frac{1}{2}, 4, -\frac{3}{2}\right)$

$$\xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) x = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) X \quad \text{作 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

P269.10. 设

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \therefore$$

$$x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

解 只要 $k \neq 0$ 即可, 取 $k=1$ 即有 $\xi = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4 = (1, 1, 1, -1)$

P269.11, $V_1 = R_R, V_2 = R^+_{R}$ 规定 $B : R \rightarrow R^+, a \rightarrow e^a$ (自然对数)

则 B 是 $1-1$ 的和映上以 $(a \neq b \Rightarrow e^a \neq e^b, \text{ 正定 } b \text{ 原为 } \ln b)$

又 $\delta(a+b) = e^{a+b} = e^a \cdot e^b = e^a \oplus e^b = \delta(a) \oplus \delta(b)$

$$\delta(ka) = e^{ka} = (e^a)^k = k \cdot e^a = k \cdot \delta(a)$$

故 δ 就是同构, $R \cong R^+$ 其实任取一个数 $d (d > 0, d \neq 1)$ 代替 e 均可:

(p269) 12 设 $V_1 \subseteq V_2, V_1 \leq V, V_2 \leq V$, 且 $\dim V_1 = \dim V_2$

证明 $V_1 = V_2$

只须证 $V_1 \supseteq V_2$

证: 设 $\dim V_1 = \dim V_2 = r$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 V_1 的个基任取 $\beta \in V_2$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V_2$ 且在 V_2 中线性无关.

因为 $\dim V_2 = r$, 故 V_2 中这 $r+1$ 个向量 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 线性相关, 由临界定理.

$$\beta \leftarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \Rightarrow \beta \in V_1$$

即 $V_2 \subseteq V_1$ 中 (得证)

$$(P_{269}, 13), C(A) = \{x \in P^{n \times n} \mid AX = XA\} \subseteq P^{n \times n}$$

$$1) \because 0 \in C(A) \neq \emptyset$$

$$\begin{aligned} \forall X, Y \in C(A) \Rightarrow A(X+Y) &= AX + AY = XA + YA = (X+Y)A \\ \Rightarrow A(kX) &= k(AX) = k(XA) = X(kA) \end{aligned}$$

$$\therefore x+y, kA \in C(A) \text{ 即 } C(A) \leq P^{n \times n}$$

$$2) \because \forall x \in P^{n \times n}, \text{ 有 } XE = EX, \text{ 故 } X \in C(E)$$

$$\therefore P^{n \times n} \subseteq C(E) \text{ 但 } C(E) \subseteq P^{n \times n}$$

$$\therefore \text{当 } A = E \text{ 时, } C(A) = C(E) = P^{n \times n}$$

$$3) \forall x = (x_{ij}) \in P^{n \times n} \quad \text{由于} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix}$$

$$\text{有 } X \in C(A) \Leftrightarrow XA = AX$$

$$\Leftrightarrow XA \text{ 第 } i \text{ 行 } j \text{ 列元素, } jx_{ij} = AX \text{ 第 } i \text{ 行 } j \text{ 列元素 } ix_{ij}, \\ (\forall, ij)$$

$$\Leftrightarrow (\forall i, j), xi_j(i-j) = 0$$

$$\Leftrightarrow i \neq j \text{ 时 } xi_j = 0, \text{ 若 } i = j, \text{ 则 } i = j, \text{ 则 } x_{ii} \text{ 任意}$$

$$\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} x_{11} & & & \\ & x_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n x_{ii} E_{ii}$$

$E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$ 线性无关

此时 $C(A)$ 是全体对角矩阵, $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$ 是它的一个基, 故 $\dim C(A) = n$

$$\text{P270.14 设 } x = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ q & h & i \end{pmatrix} \quad Ax = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & e & f \\ 3a+d+2g & 3b+e+2h & 3c+f+2i \end{pmatrix}$$

$$XA = \begin{pmatrix} a+3c & b+c & 2c \\ d+3f & e+f & 2f \\ q+3i & h+i & 2i \end{pmatrix} \quad \therefore AX = XA \Rightarrow a = a+3c \Rightarrow c = 0, d = d+3f \Rightarrow f = 0$$

$$\begin{aligned} \text{且 } \begin{cases} 3a+d+2g = g+3i \\ 3b+e+2h = h+i \\ 2i = 2i \end{cases} &\quad \therefore \begin{cases} 3a+d+q = 3i \\ 3b-e+h = i \\ i, a, d, b, e \text{ 任意} \end{cases} \end{aligned}$$

\therefore 依次取 $(a, b, d, e, i) = \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5$ 得 基元素

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\dim C(A) = 5$$

$$P270.15 \quad c_1c_3 \neq 0, \quad c_1d + c_2\beta + c_3r = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{c_2}{c_1}\beta - \frac{c_3}{c_1}r, \quad r = \frac{c_1}{c_3}\alpha - \frac{c_2}{c_3}\beta$$

$$\therefore \alpha \cdot \beta \xrightarrow{\rightarrow} \beta \cdot r \Rightarrow L(\alpha \cdot \beta) = L(\beta \cdot r)$$

$$P270.16(1) \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \therefore \alpha_4, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关}$$

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ 故基为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$,

$$P270.16(2) \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2, \alpha_1, \alpha_2 \text{ 是一个极大无关组}$$

$$\therefore \dim L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2, \alpha_1, \alpha_2 \text{ 是它的一个基}$$

$$P270.17 \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 5 & -13 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 & 4 \\ 0 & -3 & 8 & -7 \\ 0 & 3 & -8 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2/3 & -5/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & -8/3 & 7/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/9 & -2/9 \\ 0 & 1 & -8/3 & 7/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 24 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} \left(\begin{array}{c|cc} 2 & \\ -21 & \\ 0 & \\ 9 & \\ \hline 0 & 9 \end{array} \right)$$

系数矩阵为 A , 秩 $(A) = 2$ 基础解系含 $4-2=2$ 个向量, 可为

∴解空间的维数为2, 基底一个是

$$(-1, 24, 9, 0), (2, 21, 0, 9)$$

(P270, 18, ①) 解设 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$

若设 $r = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = x_3\beta_1 + x_4\beta_2$ 即 $r \in V_1 \cap V_2$

$$\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 3x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - 7x_4 = 0 \end{array} \right. \quad \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -7 \end{array} \right) \\ \text{则} \quad \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

有非零解如

即

∴秩($\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$)=3 所以 $\dim(V_1 \cap V_2) = 2 + 2 - 3 = 1$ 维

它的一个基是 $r = (-5, 2, 3, 4)$

(P270, 18, ②) 解: 设 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$ 则由

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

由此秩($\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$)=4 ∴ $\dim(V_1 + V_2) = \dim L(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = 4$ 而

$\dim V_1 = \dim V_2 = 2$, 所以 $\dim(V_1 \cap V_2) = 2 + 2 - 4 = 0$

此时 $V_1 \cap V_2$ 没有基.

(P270, 18, ③) 解: 设 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & +2 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \quad \therefore \dim V_1 = 3$$

秩为3 显有 $\dim V_2 = 2$

设 $r = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = x_4\beta_2 \in V_1 \cap V_2$ 则得

$$\begin{cases}
x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + x_5 = 0 \\
2x_1 + x_2 - 5x_4 - 2x_5 = 0 \\
-x_1 + x_2 + x_3 + 6x_4 + 7x_5 = 0 \\
-2x_1 + x_2 - x_3 + 5x_4 - 3x_5 = 0
\end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 7 \\ -2 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & -4 \\ 0 & 4 & 0 & 8 \\ 0 & 7 & -3 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 13 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 11 & 27 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \text{秩为3: 即秩} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2) = 4$$

$\therefore \dim(V_1 + V_2) = 4$ 故 $\dim(V_1 \cap V_2) = 5 - 4 = 1$
取方程组一个非零解 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (3, -1, -2, 1, 0)$
即 $\beta_1 = r = 3\alpha_1 - \alpha_2 - 2\alpha_3 \in V_1 \cap V_2$ 是一个所求的基

P270.19 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 的空间 $V_1 \quad \dim V_1 = n - \text{秩}(1, 1, 1, \dots, 1) = n - 1$

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0 \text{ 的解空间 } V_2, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ & 1 & 1 & \dots & 1 \\ & & 1 & \dots & 1 \\ & & & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 的解空间 V_2

$\dim V_2 = n - \text{秩}(A) = n - (n - 1) = 1$

$$\begin{aligned}
\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in V_1 \cap V_2, \text{ 则} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \overset{\Delta}{\alpha_n} = \alpha \\
\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (= n\alpha) = 0
\end{aligned}
\right\} \Rightarrow \alpha = 0$$

若

$\therefore \xi = (\alpha, \alpha, \dots, \alpha) = 0$ 即由定理8推论 $V_1 + V_2$ 是直和

$\because \dim(V_1 \oplus V_2) = (n - 1) + 1 = n$ 是 $V_1 + V_2 \subseteq P^n$,

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim P^n \text{ (由12题6.88.8.3) } P^n = V_1 \oplus V_2$$

P271, 20, 设 $V = V_1 \oplus V_2, V_1 = V_{11} \oplus V_{12}$ 那么 $V = V_{11} \oplus V_{12} \oplus V_2$

证一: 设 $0 = \alpha_{11} + \alpha_{12} + \alpha_2 \because V = V_1 \oplus V_2$

$\therefore \alpha_2 = 0, \alpha_{11} + \alpha_{12} \in V_1$ 也为0 即

$O = \alpha_{11} + \alpha_{12}$ 为 $V_{11} \oplus V_{12}$ 的直和分解或故

$\alpha_{11} = 0, \alpha_{12} = 0$, 所以 0 有唯一分解式 $0 = 0_{11} + 0_{12} + 0_2$

$$\therefore V = V_{11} \oplus V_{12} \oplus V_2$$

证二: $\dim V = \dim V_1 + \dim V_2 = (\dim V_{11} + \dim V_{12}) + \dim V_2$

证毕

P271.21 $\because V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 作 $W_i = L(\alpha_i)$

若 $\forall \beta \in V$ $\beta = \sum_{i=1}^n \beta_i = \sum_{i=1}^n r_i$ $\beta_i V_i \in W_i$ 可设 $\beta = b_i \alpha_i, y_i = -\frac{c_2}{c_3} \beta$

$\Rightarrow 0 = \sum (\beta_i - r_i) = \sum (b_i - c_i) d_i$, 无关性 $\Rightarrow b_i - c_i = 0 \therefore b_i = c_i$

因此 $\beta_i = r_i \therefore \beta$ 的分解式唯一, $\therefore V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n$

P271.22 $\because W_i = \sum_{j=1}^{i-1} V_j \subseteq \sum_{j \neq i}^s V_j = V_i$ 故若 $\sum_{i=1}^s V_i$ 为直和则 $r_i \cap V_i = \{0\}$

$\therefore V_i \cap W_i = \{0\}$ 从而必要性显然.

反过来证充分性

若 $\sum_{i=1}^s V_i$ 不是直和, 有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_i \in V_i$ 不全为 0, 且 $0 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$

α_k 为 $\alpha_s, \alpha_{s-1}, \dots, \alpha_2, \alpha_1$ 中第一个不为 0 的向量故

$$0 \neq \alpha_k = (-\alpha_1) + (-\alpha_2) + \dots + (-\alpha_{k-1}) \subseteq \sum_{j=1}^{k-1} V_j = W_K$$

显然若 $k=1 \Rightarrow \alpha_1 \neq 0, \alpha_2 = \dots = \alpha_s = 0$, 而 $0 - \alpha_1 + 0 + 0 + \dots + 0$ 矛盾 $\therefore k \geq 2$

又 $\alpha_k \in V_k$ 从而 $V_k \cap W_k \neq \{0\}$ 与已知矛盾, 故

$$\sum_{i=1}^s V_i = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$$

P271.23 ② 当平面经过原点是线性子空间, 不经过原点则不是

\therefore 若 $0 \in$ 平面 $\alpha \in$ 平面

则 $k\alpha (k \neq 1) \notin$ 平面

23② L_1+L_2 生成直线 ($\text{当 } L_1 = L_2$)

生成直线 ($\text{当 } L_1 \neq L_2$)

$L_1+L_2+L_3$ 生成直线 ($\text{当 } L_1 = L_2 + L_3$)

生成直线 ($\text{当 } L_1, L_2, L_3, \text{共面}$)

生成空间 R^3 ($\text{当 } L_1, L_2, L_3, \text{不共面}$)

23②当然不一定有 如右图

$V+V$ 不 x 平面 y 为平面中线

$$y \subseteq x$$

但 $y \cap V = 0, Y \cap V = 0, \therefore y \neq (y \cap V) + (y \cap V) = 0$

P₂₇₁ 补 1①因为 $f_i(x) = \frac{f(x)}{x - a_i}$ $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)$

$$f_i(a_k) = 0 (k \neq i) \quad \text{或} \quad f_i(a_i) = \prod_{(j \neq i)} (a_i - a_j)$$

如果 $n=1$, 则 $f_1(x) = 1$ 显然 ($\neq 0$) 线性无关

如果 $n \geq 2$, 而 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 线性相关, 则不妨设 $f_1(x) = \sum_{i=2} k_i f_i(x)$

但是在 $x = a_1$ 处值, 右边恒为 0, 左边为 $f_1(a_1) = \prod_{j=2}^n (a_1 - a_j) \neq 0$

矛盾 $\because f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 线性无关, 而 $\dim P[X] = n$

以及单个 $f_i(x)$, 次数 $\leq n-1$, $\therefore f_i(x) \in P[x]$. 故诸 $f_i(x)$ 形成基

P₂₇₁ 补 1② $x^n = 1$ 的单数根为 $\omega, \omega^2, \omega^3, \dots, \omega^n = 1$, (ω 本原的) $a_i = \omega^i$

$$\therefore f_i(x) = \frac{f(x)}{x - a_i} = \frac{x^{n-1}}{x - \omega^i} = \frac{\omega^n - (\omega^i)^n}{x - \omega^i} = x^{n-1} + \omega^i x^{n-2} + \omega^{2i} x^{n-3} + \dots + \omega^{(n-1)i}$$

$$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)) = (1, x, x^2, \dots, x^{n-1}) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} & 1 \\ \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(n-1)} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)^2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} & 1 \\ \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(n-1)} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)^2} & 1 \end{pmatrix}$$

(P271 补 2) 因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 设秩 $(A) = r, \exists P, Q$ 可逆使
 $A = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times s} Q$

$$\text{所以 } (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s, 0, \dots, 0)$$

$$\therefore \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \leftarrow r_1, r_2, \dots, r_r \text{ 但 } Q \text{ 可逆 } (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s, 0, \dots, 0) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) Q^{-1}$$

$\therefore r_1, r_2, \dots, r_r \leftarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 由定理了

$$\dim(L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)) = \dim(L(r_1, r_2, \dots, r_r)) = \text{秩}(r_1, r_2, \dots, r_r) = r = \text{秩}(A)$$

P271 补 3, 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_m) = x^T A X$

$$\text{由 秩}(f) = n, f \text{ 的符号差为 } S, \text{ 那么 } f \text{ 的惯性指数 } p = \frac{n+s}{2}$$

$$f \text{ 的负惯性指数 } q = \frac{1}{2}(n-s)$$

非退化线性替换, 使

$$f(x_1 \cdots x_n) = g(y_1 \cdots y_n) = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_n^2$$

作 n 维向量

$$y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_1 + \varepsilon_{p+1}, y_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_2 + \varepsilon_{p+2}, \dots, y_q = \varepsilon_q + \varepsilon_{p+q} = \varepsilon_q + \varepsilon_n$$

那么 $g(y_1, \dots, y_n)$ 在 y_i 处的值为 0 且，若

$$y_o = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_q y_q$$

则 $g(y_1, \dots, y_n)$ 在 y_o 的值为 $b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_q^2 - b_1^2 - b_q^2 = 0$

于是 $V_2 = L(y_1, y_2, \dots, y_q)$ 及 $V_1 = L(cy_1, cy_2, \dots, cy_q)$

$\therefore f$ 在 V_1 中任意处 $\sum_{i=1}^q q_i(cy_i)$ 的值，等于 q 在 $\sum_{i=1}^q a_i y_i$ 的值为 0

$\because y_1, y_2, \dots, y_q$ 线性无关， $\therefore x_1 = cy_1, x_2 = cy_2, \dots, x_q = cy_q$ 线性无关

$$\therefore \dim V_1 = q = \frac{1}{2}(n-s) = \frac{1}{2}(n-s)$$

b° 如果 $s < 0$ 则 $p < q$ 作 $x = cy, f = g(y_1, \dots, y_n)$ 为规范形

这对可取 y_1, y_2, \dots, y_p 生成 V_2 且 V_2 要化 g

同时作 $V_1 = g(x_1, x_2, \dots, x_p) = L(y_1, y_2, \dots, y_p)$

(同 a°) V_1 即使得 $f/V_1 = 0$ 且

$$\dim V_1 = P = \frac{1}{2}(n+s) = \frac{1}{2}(n+s)$$

(P271 补 4) 证法一： $\because V_1 \neq V, V_2 \neq V$

故若 $V_1 \subseteq V_2$ 则取 $\alpha \notin V_2$ (α 必存在) 即可

若 $V_1 \supseteq V_2$ 则任取 $\alpha \notin V_1$ (α 也存在) 即可

若 $V_1 \not\subseteq V_2, V_2 \not\subseteq V_1$ 则可取 $\alpha \in V_1, \alpha \notin V_2$ 和 $\beta \in V_2, \beta \notin V_1$

$\because \alpha + \beta \in V_2 \Rightarrow \beta \in V_1$ 矛盾, $\alpha + \beta \in V_1$ 也矛盾 $\therefore \alpha + \beta \notin V_1, \notin V_2$ 即为所求.

证法 2：若 $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$, 同上显然

当 $V_1 \subseteq V_2, V_2 \not\subseteq V_1$ 时, 取 $\alpha \notin V_1, \beta \in V_1, \beta \in V_2$, 考虑一切的 $\alpha + k\beta$ 如右图

$\{\alpha + k\beta\}$ 理解为 V_1 的平行体.

断言 (a) 若有 $\alpha \in P, \alpha + k\beta \in V_1$ (b) 至多存在一个 k , 使 $\alpha + k\beta \in V_2$

证 (a) 有 $k \in P, \alpha + k\beta \in V_1 \because \beta \in V_1 \Rightarrow \alpha = (\alpha + k\beta) - k\beta \in V_1$, 矛盾!

(b) 若有 $k_1 \neq k_2 \in P$ 使 $\alpha + k_1\beta \in V_2, \alpha + k_2\beta \in V_2$ 则, $k_1\beta - k_2\beta \in V_2$

$$\Rightarrow (k_1 - k_2)\beta \in V_2 \Rightarrow \beta \in V_2 \text{ 矛盾!}$$

故若 $k_o \in p\alpha + k_o\beta \notin V_2$, 则 $\alpha + k_o\beta$ 即为所求, $\notin V_1, \notin V_2$,

若 $\alpha + k_o\beta \in V_2$ 则任取 $k_1 \neq k_o$ 有 $\alpha + k_1\beta \notin V_1, \notin V_2$ 即为所求

证法二虽然思想复杂, 却可以把问题做大

(P272) 补 5

$$s=1 \text{ 虽然 } (\because V_1 \text{ 非平凡}, : V_1 \neq V)$$

$s=2$ 命题已证, 即第 4 题设 $S=k$ 时命题成立, 考虑 $s=k+1$ 时, $V_1, V_2, \dots, V_k, V_{k+1}$ 皆非平凡了空间对于 V_1, V_2, \dots, V_k 任取 $\alpha \notin V_{k+1} (\because V_{k+1} \neq V)$ 考虑一切 $\alpha + k\beta$

同样 (类似 4 题证法 $(P_6, 92, 12, 3)$), $\forall k \in p, \alpha + k\beta \in V_{k+1}$ 对每个 $V_i (i=1, 2, \dots, k)$ 至

多只须一个使, $\alpha + k_i\beta \in V_i$

取 r_o 为不同于 $r_1, r_2, \dots, r_k, 1$ 的任一数即

$$t_o \in p - \{t_1, t_2, \dots, V_k, V_{k+1}\}$$

那么 $t_o \notin V_1, V_2, \dots, V_k, V_{k+1}$ $\therefore \alpha + t_o\beta$ 即为所求

第九章 第九章 欧几里得空间习题解答

P394.1.1

A 正定 $\therefore (\alpha, \alpha) = \alpha A \alpha' \geq 0 (" = " \Leftrightarrow \alpha = 0)$ 非负性证得

由矩阵失去, 线性性成立, 再由 $(\beta, \alpha) = \beta A \alpha' = (\beta A \alpha')' = \alpha' A' \beta = (\alpha, \beta)$ 对称性成立, 是一个内积

$$\text{P394.1.2} \quad (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = (0 \cdots \underset{i}{\underset{\cdot}{1}} \cdots 0 \cdots 6) A \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}; = \alpha_{ij}$$

$\therefore \varepsilon_i, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n$ 的度量矩阵即为 A

$$\text{P394.1.2} \quad |(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| |\beta|$$

$$\because (\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

$$\therefore c - s - B \text{ 不等式为 } |(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j)| \leq \sqrt{(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j)(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} y_i y_j)}$$

$$P393.2 \textcircled{1}, \alpha = (2, 1, 3, 2), \beta = (1, 2, -2, 1)$$

$$\therefore |\alpha| = \sqrt{18} = \sqrt[3]{2}, |\beta| = \sqrt{10}, (\alpha, \beta) = 0, \therefore \alpha \perp \beta$$

$$\therefore \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{\pi}{2}$$

$$P393.2 \textcircled{2}, \alpha = (1, 2, 2, 3), \beta = (3, 1, 5, 1)$$

$$|\alpha| = \sqrt{18} = \sqrt[3]{2}, |\beta| = \sqrt{36} = 6, (\alpha, \beta) = 18$$

$$\therefore (\alpha, \beta) = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|} = \arccos \frac{18}{\sqrt[3]{2}, 6} = \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$P393.2 \textcircled{3}, \alpha = (1, 1, 1, 2), \beta = (3, 1, -1, 0)$$

$$|\alpha| = \sqrt{7}, |\beta| = \sqrt{11}, (\alpha, \beta) = 3$$

$$\therefore \langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{3}{\sqrt{77}} = 70^\circ 0' 30'' 38$$

$$\text{P393.3} \quad \because |\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

$$\begin{aligned} \therefore d(\alpha, \gamma) &= |\alpha - \gamma| = |(\alpha - \beta) + (\beta - \gamma)| \leq |\alpha - \beta| + |\beta - \gamma| \\ &= d(\alpha, \beta) + d(\beta, \gamma) \end{aligned}$$

P393.4 在 R^4 中求一单位向量与 $(1, 1, -1), (1, -1, 1, 1), (2, 1, 1, 3)$ 正交
解设所求

$\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 则 $\sum x_i^2 = 1$, 且

x 与各向量的内积为 0 得

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{array} \right.$$

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

令 $x_4 = 3$, 得

$$x_1 = 4, x_2 = 0, x_3 = -1$$

$$\alpha = \frac{1}{\pm\sqrt{26}}(-4, 0, -1, 3), \quad (\text{单位化})$$

P393.5 ① 证: 因为 $(\gamma, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一个基

$$\therefore (\gamma, \gamma) = (\gamma, \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^n k_i (\gamma, \alpha_i) = 0.$$

因此, 必有 $\gamma = 0$.

P393.5 ② 证, $\because (\gamma_1, \alpha_i) = (\gamma_2, \alpha_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$,

$$\therefore (\gamma_1 - \gamma_2, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

由第 ① 小题: $\gamma_1 - \gamma_2 = 0$, 故 $\gamma_1 = \gamma_2$

$$\therefore (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

P393.6

$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是标准正交基
而

P393.7

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 \varepsilon_s, \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4 / \varepsilon_3 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

解: $\beta_1 = \alpha_1$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \alpha_2 - \frac{1}{2} \beta_1 = \frac{1}{2} \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4 - \frac{1}{2} \varepsilon_5 = \frac{1}{2} (\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_4 - \varepsilon_5)$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{2}{2} \beta_1 - \frac{1}{10} \beta_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_5$$

再正交化称:

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varepsilon_1 + \varepsilon_5)$$

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} (\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_4 - \varepsilon_5)$$

$$\eta_3 = \frac{1}{2} (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_5)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 5 \end{pmatrix} X = 0$$

P394.8, 解:

$$\text{解出: } \eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Schmidt:

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \eta_2 - \frac{1}{2} \beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \eta_3 + \frac{5}{2} \beta_1 + \frac{13}{10} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \\ 6 \\ 13 \\ 5 \end{pmatrix}$$

单位化便得到解空间的标准正交基:

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{2}{\sqrt{10}} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{315}} = \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \\ 6 \\ 13 \\ 5 \end{pmatrix}$$

P394.9 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$

已知 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \alpha_3 = x^2, \alpha_4 = x^3$

解: $\beta_1 = \alpha_1 = 1$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = x - \frac{\int_{-1}^1 x dx}{*} x$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = x^2 - \frac{\frac{2}{3}}{2} 1 - 0 = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$\beta_4 = \alpha_4 - \frac{(\alpha_4, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_4, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \frac{(\alpha_4, \beta_3)}{(\beta_3, \beta_3)} \beta_3 = x^3 - 0 - \frac{\frac{5}{2}}{3} x = x^3 - \frac{3}{5} x$$

又 $\because (\beta_1, \beta_1) = 2 \quad |\beta_1| = \sqrt{2}, \quad (\beta_2, \beta_2) = \frac{2}{3} \quad |\beta_2| = \frac{2}{\sqrt{6}}$

$$(\beta_3, \beta_3) = \int_{-1}^{+1} (x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}) dx = \frac{8}{45} \quad |\beta_3| = \frac{4}{\sqrt[3]{10}}$$

$$(\beta_4, \beta_4) = \int_{-1}^1 (x^6 - \frac{6}{5}x^4 + \frac{9}{25}x^2) dx = \frac{8}{175} \quad |\beta_4| = \frac{4}{\sqrt[5]{14}}$$

单位化标准正交基

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \gamma_2 = \frac{\sqrt{6}}{2} x, \quad \gamma_3 = \frac{\sqrt{10}}{4} (3x_2 - 1), \quad \gamma_4 = \frac{\sqrt{14}}{4} (5x^3 - 3x)$$

P396.17.4

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix} \quad A + 4E = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$\therefore \text{秩}(A + 4E) = 1 \quad \therefore \lambda_1 = 4$ 至少为 $A + 4E$ 的三重根, 而

$$-(4+4+4) + \lambda_2 = \text{Tr}(A) = -4 \Rightarrow \lambda_2 = 8$$

$\lambda_1 = -4$ 解 $(A + 4E)x = 0$, 即 $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$

得正交基础体系

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

单位化为

$$\frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = 8$ 解 $(A - 8E)x = 0$. 得解取自 $A + 4E$ 的一列

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

单位化为

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{12}} & \frac{-1}{2} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{则 } T^T A T = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} -4 & & & \\ & -4 & & \\ & & -4 & \\ & & & 8 \end{pmatrix}$$

P395.10.1 $0 \in V_1 \neq \emptyset$

$$\left. \begin{array}{l} (\beta_1, \beta_2, \alpha) = (\beta_1, \alpha) + (\beta_2, \alpha) = 0 \Rightarrow \beta_1 + \beta_2 \in V_1 \\ (k\beta_1, \alpha) = k(\beta_1, \alpha) = 0 \Rightarrow k\beta_1 \in V \end{array} \right\} \therefore V_1 \leq V.$$

P395.10.2 $\because \alpha \neq 0 \quad \therefore \alpha \notin V_1 \quad \text{故 } \dim V_1 \leq n-1.$

将 α 扩充为 V 的一个正交基 $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$, 那么.

$\alpha i \in V_1 (i \geq 2) \quad \therefore L(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) \leq V_1 \Rightarrow \dim V_1 \geq n-1.$

$\therefore \dim V_1 \geq n-1.$

P394, 11① 设两个基: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 及 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 它们的度量矩阵分别为 A 和 B , 并设

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)C$$

$$\begin{aligned} \text{任设 } \alpha, \beta \in V, \alpha &= (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)X_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)X_2 \\ \beta &= (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)Y_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)Y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } X_1 &= CX_2, Y_1 = CY_2 \\ (\alpha, \beta) &= X_2^T BY_2 = X_1^T AY_1 = X_2^T (C^T AC)Y_2 \end{aligned}$$

$$\therefore C^T AC = B \text{ (合同)}$$

P394.11②,

取V的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 其度量矩阵为A, 因为A正交, 故存在矩阵C, 使

$$C^T AC = E$$

做基 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$, 那么 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的度量矩阵为 $C^T AC = E$, 因此 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为标准正交基.

P394.12, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$ $\alpha_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$ 记:

$$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = (\alpha_{ij})_{m \times m}$$

称 $G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的Gram矩阵

称 $|G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)|$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的Gram行列式

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow |G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)| \neq 0$

证: 若 $m=1$, α_1 线性无关 $\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_1) > 0 \Leftrightarrow |G(\alpha_1)| = |\alpha_1|^2 \neq 0$, 成立

若 $m > 1$, 而 $|G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)| = 0$

不妨设 $A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$

$$\Leftrightarrow \beta_j = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^m c_k \beta_k \Leftrightarrow \alpha_{ij} = \sum_{k \neq j} c_k \alpha_{ik} = \sum_{k \neq j} c_k (\alpha_i, \alpha_k)$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_i, \alpha_j - \sum_{k \neq j} c_k \alpha_k) = 0, \therefore \Leftrightarrow \gamma = 0, i = 1, 2, \dots, m.$$

$$\because \gamma = \alpha_j - \sum_{k \neq j} c_k \alpha_k \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m),$$

$$\Leftrightarrow \alpha_j = \sum_{k \neq j} c_k \alpha_k \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \text{ 线性相关}$$

$$|G(\alpha_1)| = |\alpha_1|^2$$

$$|G(\alpha_1, \alpha_2)| = \begin{vmatrix} (\alpha_1, \alpha_2), (\alpha_1, \alpha_2) \\ (\alpha_2, \alpha_1), (\alpha_2, \alpha_2) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} |\alpha_1|^2 & |\alpha_2| |\alpha_1| \cos \theta \\ |\alpha_1| |\alpha_2| \cos \theta & |\alpha_2|^2 \end{vmatrix}$$

$$= |\alpha_1|^2 |\alpha_2|^2 (1 - \cos^2 \theta) = (|\alpha_1| |\alpha_2| \cos \theta)^2$$

类似地：

$$|G(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = (\text{平行六面体积})^2$$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_n & \alpha_n & \cdots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

P394, 13, 设：

因为 A 正交，故 $A^T A = E$ ，令 $A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$

由第 1 行列， $\alpha_{11}^2 = 1, \alpha_{11} = \pm 1$

由 β_1 与其余各列正交， $\beta_1 \perp \beta_j$ ($j > 1$)， $(\beta_1, \beta_j) = a_{1j} \alpha_{1j} = 0 \Rightarrow a_{1j} = 0 (j > 1)$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

其中 A_1 仍为上三角正交矩阵，但阶数少 1，故可用归纳法给出证明，且 $n=1$ 时显然为真，由归纳法原理，证毕。

P394, 14①, 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 做成 \mathbb{R}^n 的一个基，用 Schmidt 方法 把它们正交化 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ，由定理 2 (P9, 130, 4.1)

$$L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_i) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i), \forall_i$$

$$\therefore (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ & t_{22} & \cdots & t_{in} \\ & & \ddots & t_{n-1n} \\ & & & t_{nn} \end{pmatrix}, t_{ii} > 0$$

$$\text{令 } Q = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \text{ 正交, } T_1 = \begin{pmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1n} \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{nn} \end{pmatrix}, T = T_1^{-1}$$

$$\therefore Q = AT_1$$

$$A = QT_1^{-1} = QT$$

(唯一性) 若 $A = QT = Q_2 T_2$

$$\therefore Q_2^{-1}Q = T_2T^{-1}$$

\therefore 上三角矩阵 T_2T 为正交矩阵 $Q_2^{-1}Q$

$\because T_2, T$ 的对角线皆大于 0, $\therefore T_2T^{-1}$ 的对角线皆大于 0, 由 13 题 (见 P19, 138, 10. 1)

$$T_2T^{-1}=E, \quad \therefore T_2=T, \text{ 满秩}$$

$$\therefore Q_2=Q$$

P394, 14②, $\because A$ 正交, 则存在 C 可逆使

$$A=C'C$$

而 C 可逆, 由 ①, 有 $C=QT$, Q 正交 T 上三角。

$$\therefore A=C'C=T'Q'T=T'ET=T'T$$

P395, 15①, $A\alpha = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$ $\eta \in V$ 为一单位向量

$$\begin{aligned} \because (A\alpha, A\beta) &= (\alpha - 2(\eta, \alpha)\eta, \beta - 2(\eta, \beta)\eta) \\ &= (\alpha, \beta) - 2(\eta, \alpha)(\eta, \beta) - 2(\eta, \beta)(\alpha, \eta) + 4(\eta, \alpha)(\eta, \beta)(\eta, \eta) \\ &= (\alpha, \beta) \end{aligned}$$

$\therefore A$ 保持内积

$$\text{又 } A(k\alpha + l\beta) = k\alpha + l\beta - (2\eta, k\alpha + l\beta)\eta$$

$$= k(\alpha - 2(\eta, \alpha))\eta + l(\beta - 2(\eta, \beta))\eta = kA\alpha + lA\beta$$

$\therefore A$ 为线性的, 故 A 是正交变换

P395, 15②, 以 η 为起点, 扩充一个标准正交基, $\varepsilon_1 = \eta, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n$

$$\text{则 } A\varepsilon_1 = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_1 = -\varepsilon_1 \quad A\varepsilon_i = \varepsilon_i - 0 = \varepsilon_i (i \geq 2)$$

$$\therefore A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} -1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore |A| = -1$, 为第二类的

P395, 15③, $\because 1$ 至少为 A 的 $n-1$ 重特征值, 特征子空间 $V_1 = n-1$,

取 V_1 的标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1}$ 扩充为 V 的标准正交基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}, \varepsilon_n$

$\because A\varepsilon_i = \varepsilon_i (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 而 $A\varepsilon_n$ 与 $A\varepsilon_i$ 正交 ($i = 1, 2, \dots, n-1$)

$$\therefore A\varepsilon_n \in (L(A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_{n-1}))^\perp = (L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n))^\perp = L(\varepsilon_n)$$

$A\varepsilon_n = \pm \varepsilon_n$ ($\because A$ 正交), 若 $A\varepsilon_n = \varepsilon_n \Rightarrow \dim V_1 = n$ 矛盾, $\therefore A\varepsilon_n = -\varepsilon_n$

$$\forall \alpha \in V, \quad \alpha = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i$$

$$A\alpha = \sum_{i=1}^{n-1} x_i \varepsilon_i - x_n \varepsilon_n = \alpha - 2x_n \varepsilon_n = \alpha - 2(\varepsilon_n, \alpha) \varepsilon_n$$

是一个镜面反射

P395, 16, 若 $A' = -1$, λ_0 为 A 的特征值, X_0 为其特征向量

$$\begin{aligned} X_0 &\neq 0, \quad \therefore \overline{X_0}' X_0 \neq 0 \\ AX_0 &= \lambda_0 X_0 \quad A\overline{X_0} = \overline{AX_0} = \overline{\lambda_0 X_0} = \overline{\lambda_0} \overline{X_0} \\ \therefore \lambda_0 \overline{X_0}' X_0 &= \overline{X_0}' (\lambda_0 X_0) = \overline{X_0}' (AX_0) = -(\overline{X_0}' A') X_0 = -((\overline{AX_0})') X_0 \\ &= -(\overline{AX_0})' X_0 = -(\overline{\lambda_0 X_0}') X_0 = -\overline{\lambda_0} (\overline{X_0}' X_0) \\ \therefore (\text{由 } \overline{X_0}' X_0 \neq 0) \quad \lambda_0 &= -\overline{\lambda_0} \quad \lambda_0 = 0 \text{ 或纯虚数} \end{aligned}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda + 2)$$

P395, 17①:

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -2$$

解: $(A - \lambda_1 E) X = 0$

$$(A - E) X = 0, \quad X = (2, 1, -2)', \quad \varepsilon_1 = \frac{1}{3}(2, 1, -2)'$$

$$\text{解: } (A - 4E) X = 0, X = (2, -2, 1)', \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{3}(2, -2, 1)'$$

$$\text{解: } (A + 2E) X = 0, X = (1, 2, 2)', \quad \varepsilon_3 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)'$$

$$\text{令 } T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{则: } T' A T = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{P395, 17②, } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

解: ①: $\because A - \lambda E$, (λ 用数 1 代), $A - E$ 的秩为 1

$$\therefore |\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - \lambda_2), \therefore \lambda_2 = \text{Tr}(A) - \lambda_1 - \lambda_1 = 10$$

$$2^\circ, (A - E)(A - 10E) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \text{ 解: } x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \text{ 得: } \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5/2 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{45} \\ 4/\sqrt{45} \\ 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 10, \text{ 取 } A - E \text{ 的一列: } \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

$$3^\circ, \text{ 取 } T = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} & 2/\sqrt{45} & 1/3 \\ -1/\sqrt{5} & 4/\sqrt{45} & 2/3 \\ 0 & 5/\sqrt{45} & -2/3 \end{pmatrix}$$

$$\text{则: } T^T A T = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

P395,17③,

$$\begin{aligned} \text{解: } |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 4 & 1 \\ 0 & -\lambda & 1 & 4 \\ 4 & 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(3-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} - \\ &= (\lambda-3)(\lambda-5) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & -\lambda & 1 & 4 \\ 4 & 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-3)(\lambda-5) \begin{vmatrix} -\lambda & -3 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda-5) \begin{vmatrix} -\lambda & -3-\lambda & 3+\lambda \\ 1 & -\lambda-3 & -1-1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (\lambda-3)(\lambda-5)(\lambda+3) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -\lambda-3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda+3)(\lambda-5)(\lambda+5) \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 5, \lambda_4 = -5$$

解: $(A - \lambda_1 E) X = 0$

$$(A - 3E) X = 0, \text{ 得: } X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)'$$

解: $(A + 3E) X = 0, \text{ 得: } X = (1, -1, -1, 1)', \therefore \varepsilon_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)'$

解: $(A - 5E) X = 0, \text{ 得: } X = (1, 1, 1, 1)', \therefore \varepsilon_3 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)'$

解: $(A + S) X = 0, \text{ 得: } X = (1, 1, -1, -1)', \therefore \varepsilon_4 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)'$

$$\text{令: } T = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\text{则: } T'AT = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 3 & & & \\ & -3 & & \\ & & 5 & \\ & & & -5 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

P395,17⑤:

解: 秩 $(A) = 1, \therefore \lambda_1 = 0$ 为 A 的 3 重根 (特征根)

$$\lambda_1 + \lambda_1 + \lambda_1 + \lambda_2 = Tr(A), \therefore \lambda_2 = 4$$

$$\therefore A(A - 4E) = 0$$

对于 $\lambda_1 = 0$, 解: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$
得:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ 单位化: } \varepsilon_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{12}} \\ -\frac{3}{\sqrt{12}} \end{pmatrix}$$

对于 $\lambda_2 = 4$, 其解为 A 的一列: $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

$$\text{令 } T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{12} & 1/2 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{12} & 1/2 \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{12} & 1/2 \\ 0 & 0 & -3/\sqrt{12} & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } T^{-1}AT = T'AT = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}$$

$$f = X' \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} X, B \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

P395, 18 ① $f = X'$

$$\begin{pmatrix} & 1 \\ & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}, (H^{-1} = H' = H)$$

$$\therefore A = H'BH - E = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} E = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ 即为 170 中的 } A (\text{ 见 P9, 139, 11, 4 })$$

$$\text{取 } T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ 正交, 则 } T'AT = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & -2 \end{pmatrix} = T'(H'BH - E)T$$

$$\therefore (HT)'B(HT) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & -2 \end{pmatrix} + T'ET = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, HT = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} X_1 = -\frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{3}y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ X_2 = \frac{1}{3}y_1 - \frac{2}{3}y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ X_3 = \frac{2}{3}y_1 + \frac{2}{3}y_2 + \frac{1}{3}y_3 \end{cases}$$

即令 则 $f = 2y_1^2 + 5y_2^2 - y_3^2$

$$f = X' \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} X, B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

P395,18②

又 $\because A = -B + 3E$ 即为 17②中的A (见P9,138,10,3)

$$\text{取 } T = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{45}} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{\sqrt{45}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{45}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \text{则 } T'AT = T^{-1}(3E - B)T = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix}$$

$$\therefore T^{-1}BT = T^{-1}(3E)T = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{2}{\sqrt{45}}y_2 + \frac{1}{3}y_3 \\ x_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{4}{\sqrt{45}}y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ x_3 = \frac{5}{\sqrt{45}}y_2 - \frac{2}{3}y_3 \end{cases}, \text{ 则 } f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2$$

$$f = X' \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} X, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

P395, 18③,

$$\text{解 } |\lambda E - B| = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1), \therefore \varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } T_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } T_1 \text{ 正交, 且}$$

$$T_1' BT_1 = T_1^{-1} BT_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } T = \begin{pmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & T_1 \end{pmatrix} \text{ 也正交, } \therefore T^T AT = T^{-1} AT = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } \begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 \\ x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_3 + \frac{1}{\sqrt{2}} y_4 \\ x_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} y_3 - \frac{1}{\sqrt{2}} y_4 \end{cases}$$

$$\text{则 } f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2$$

$$f = X^T \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} X = X^T A X$$

P395, 18④,

$$\text{解: } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & \lambda - 1 & 2 & -3 \\ -3 & 2 & \lambda - 1 & 1 \\ -2 & -3 & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & \lambda - 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & \lambda - 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda - 7) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & \lambda - 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & \lambda - 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 7) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 & -1 \\ 1 & \lambda + 1 & 2 & -1 \\ 1 & \lambda + 1 & \lambda - 1 & \lambda \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda - 7)(-1)(-1)(\lambda + 3) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & \lambda + 1 & -1 \\ 1 & \lambda + 1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda - 7) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda + 3 & 0 \\ 0 & \lambda + 3 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 7)(\lambda + 1)(\lambda + 3)$$

$$\therefore \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -1, \lambda_4 = -3$$

$$(A - \lambda_1 E) X = (A - E) X = 0, \text{ 得 } X = (1, 1, 1, 1)', \varepsilon_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)'$$

$$(A - \lambda_2 E) X = (A - 7E) X = 0, \text{ 得 } X = (1, -1, 1, -1)', \varepsilon_2 = \frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)'$$

$$(A - \lambda_3 E) X = (A + E) X = 0, \text{ 得 } X = (1, 1, -1, -1)', \varepsilon_3 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)'$$

$$(A - \lambda_4 E) X = (A + 3E) X = 0, \text{ 得 } X = (1, -1, -1, 1)', \varepsilon_4 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)'$$

$$\therefore \text{令: } T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } T'AT = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 7 & & \\ & & -1 & \\ & & & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$f = y_1^2 + 7y_2^2 - y_3^2 - 3y_4^2$$

P395.19, ∵ A实对称, 存在正交矩阵T, 使

$$T'AT = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = D$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的所有特征根

A 正交 \Leftrightarrow D 正交 \Leftrightarrow 正惯性指数 = n $\Leftrightarrow \lambda_i > 0 (\forall i = 1, 2, \dots, n)$

P396.20 “充分性”, 设 λ_1 为 A 的实特征根, 取 λ_1 的单位特征向量 ε_1 , 扩充为 \mathbb{R}^n 的标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 取 $T_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ 为正交矩阵

$$T_1^{-1}AT_1 = T_1^1AT_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ & A_1 \end{pmatrix}$$

$\because |\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)|\lambda E - A_1|$, 故 A_1 的特征根全为实根, 且阶数少, 故由归纳假设 (n=1, 显然成立), 存在 T_2 正交。

$B_2 = T_2 A_1 T_2$ 为上三角矩阵

作正交矩阵 T, T_3

$$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix}, T = T_1 T_3$$

$$\text{那么, } T'AT = T^{-1}AT = T_3^{-1}(T_1^{-1}AT_1)T_3 = T_3^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha T_2 \\ 0 & T_2^T A_1 T_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \beta \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}$$

为上三角矩阵

"必要性", 若 $TAT = T^{-1}AT = B$ 为上三角

$$\because A, T \in \mathbb{R}^{n \times n}, \therefore B \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\because |\lambda E - A| = |\lambda E - B| = \prod_{i=1}^n (\lambda - b_{ii}) \text{ 全为实特征根 } b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn},$$

P396, 21 "必要性" $T^{-1}AT=B$, 则 A, B 相似, 故特征值全部相同,

"充分性", 若 A, B 的特征值都由 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$,
则存在, T_1, T_2 正交, 使

$$T_1^T AT_1 = T_1^{-1} AT_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad T_2^T BT_2 = T_2^{-1} BT_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = D$$

$$\therefore T_1^{-1} AT_1 = T_2^{-1} BT_2$$

令 $T = T_1 T_2^{-1} = T_1 T_2'$ 也是正交的, 且

$$T^{-1}AT = T_2(T_1^{-1}AT_1)T_2^{-1} = T_2DT_2^{-1} = B$$

$$\text{P396, 22, } A' = A, A^2 = A, \text{ 证存在 } T \text{ 正交, } T'AT = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

证: $\because A$ 实对称, 故必有正交矩阵 T 使

$$T^{-1}AT = T'AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

(其中特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \dots \geq \lambda_n$)

$\because A(A - E) = 0$, 最小多项式为 $x(x-1)$ 的因式, \therefore 特征多项式为 $(x-1)^r x^{n-r}$
而 λ_i 为特征值, $X - \lambda_i | (x-1)^r X^{n-r} \Rightarrow \lambda_i = 1$ 或 0

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 1, \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

证毕.

P396, 23 $A \in L(V)$ 为正交变换, 子空间 $W \leq V$ 为 A 的不变子空间

$$\begin{aligned} & \forall \alpha \in W^\perp, \text{由于对 } \forall \beta \in W \text{ 有 } A\beta \in W \text{ (必须假设 } \dim W \text{ 有限)} \\ & \because \dim W \text{ 有限}, \therefore AW = W, \forall \gamma \in W, \text{ 必有 } \beta \in W, \text{ 使 } A\beta = \gamma \\ & \therefore (A\alpha, \gamma) = (A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta) = 0 \end{aligned}$$

因此, $A\alpha \in W^\perp$

故 W^\perp 也是 A 的不变子空间

(注: 若 $\dim W = \infty$, $V = \{\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mid x_i \text{ 中有限个非 } 0\}$, $W = \{\alpha \in V \mid x_1 = \dots = x_r = 0\}$

$A\alpha = (0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots)$ 内积为对应分量之积之和, 则 A 为正交变换.
 W 为 A -子空间, $W^\perp = \{\alpha \in V \mid x_{r+1} = x_{r+2} = \dots = x_n = \dots = 0\}$, 不是 $/A$ -子空间
 $\because \gamma = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots) \stackrel{(r \uparrow)}{\in} W^\perp$, 但 $A\gamma = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \stackrel{(r+1 \uparrow)}{\notin} W^\perp$)

P396、24① “必要性”, 若 A 反对称, 在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下

$$A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)A \quad A = (a_{ij})_{n \times n}$$

则: $a_{ij} = (A\varepsilon_j, \varepsilon_i) = -(\varepsilon_j, A\varepsilon_i) = -(A\varepsilon_i, \varepsilon_j) = -a_{ji}$.

$$\therefore A' = -A$$

$$\text{“充分性”, 若 } A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)A \quad \therefore A' = -A$$

$$\forall \alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)X \quad \beta = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)Y. \quad A\alpha, A\beta \text{ 以坐标为 } AX, AY.$$

$$\therefore (A\alpha, \beta) = (AX)'Y = X'A'Y = -X'AY = -X'(AY) = -(\alpha, A\beta)$$

即, A 为反对称的

P396、242 设 V_1 为 $/A$ -子空间, A 反对称。

$$\begin{aligned} & \forall \alpha \in W \quad \forall \beta \in V_1 \quad \therefore {}_A\beta \in V_1 \\ & \therefore (A\alpha, \beta) = (\alpha, A\beta) = 0 \\ & \therefore A\alpha \in W \quad \text{故 } W \text{ 为 } A \text{-子空间。} \end{aligned}$$

P397.25. 设 $V = V_1 \oplus V_1^2$

必要性, 若 $\alpha = \beta + \gamma$, ($\beta \in V_1$, $\gamma \in V_1^2$), 则 $\forall \xi \in V_1$. $\alpha - \beta \perp \beta - \xi$

$$\therefore |\alpha - \xi|^2 = |(\alpha - \beta) + (\beta - \xi)|^2 = |\alpha - \beta|^2 \geq |\alpha - \beta|^2$$

即 $|\alpha - \beta| \leq |\alpha - \xi|$.

α 在 V_1 的分解式, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ $\alpha_1 \in V_1$ $\alpha_2 \in V_1^2$

于是 $|\alpha - \alpha_1| \leq |\alpha - \beta| \leq |\alpha - \alpha_1|$ 又 $\because \beta - \alpha_1 \in V_1$

充分性, 取 $\therefore |\alpha - \alpha_1|^2 = |\alpha - \beta|^2 + |\beta - \alpha_1|^2 \Rightarrow |\beta - \alpha_1| = 0 \Rightarrow \beta = \alpha_1$ 必为内射影.

P396, 26, 证 1) $(V_1 + V_2)^\perp = V_1^\perp \cap V_2^\perp$ 和 2) $(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$

$$\text{证 1) } \because (V_1 + V_2)^\perp \subseteq V_1^\perp, V_2^\perp \quad \therefore (V_1 + V_2)^\perp \subseteq V_1^\perp \cap V_2^\perp$$

反过来, $\forall \alpha \in V_1^\perp \cap V_2^\perp$, 则 $\forall \beta \in V_1 + V_2$ $\beta = \beta_1 + \beta_2$ ($\beta_i \in V_i$)

$$\because \alpha \perp \beta_1, \alpha \perp \beta_2, \therefore \alpha \perp \beta_1 + \beta_2 = \beta \Rightarrow \alpha \in (V_1 + V_2)^\perp$$

$$\therefore V_1^\perp \cap V_2^\perp \subseteq (V_1 + V_2)^\perp \quad \text{故} (V_1 + V_2)^\perp = V_1^\perp \cap V_2^\perp$$

2), 由于正交补是唯一的

$$\therefore (V_1 \cap V_2)^\perp = ((V_1^\perp)^\perp \cap (V_2^\perp)^\perp)^\perp = ((V_1^\perp + V_2^\perp)^\perp)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$$

$$P396, 27 \quad A = \begin{pmatrix} 0.39 & -1.89 \\ 0.61 & -1.80 \\ 0.93 & -1.68 \\ 1.35 & -1.50 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A'A = \begin{pmatrix} 3.2116 & -5.4225 \\ -5.4225 & 11.8845 \end{pmatrix} \quad A'B = \begin{pmatrix} 3.28 \\ -6.87 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A'AX = A'B, \quad |A'A| = 8.76475395 = d$$

$$\text{得: } d_x = 1.728585, d_y = -4.277892$$

$$\therefore X = \frac{d_x}{d} = 0.197220025 \approx 0.197 \quad M = \frac{d_y}{d} = -0.48867896 \approx -0.488$$

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2)$, 故 B 到子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2)$ 的垂足为 $0.197\alpha_1 - 0.488\alpha_2$

B 到 W 的距离为 $|B - 0.197\alpha_1 + 0.488\alpha_2|$

$$= \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.07683 \\ 0.12017 \\ 0.18321 \\ 0.26595 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.92232 \\ 0.8784 \\ 0.81984 \\ 0.732 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.00085 \\ 0.00143 \\ -0.00305 \\ 0.00205 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{0.000016272} = 0.004033906 \approx 0.00403$$

P397 补 1, 设 λ 为 A (正交) 的特征值, 定义 $AX=AX$, 则 A 为正交变换

$$\because AX_0 = \lambda X_0 \Rightarrow |AX_0| = |X_0| \Rightarrow |\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1, (\because \lambda \in \mathbb{R})$$

P397, 补 2, A 为 V 中正交变换, $|A|=1$

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, $\because |\lambda_i| = 1$, 及 $f_A(x)$ 是一个实系数多项式,

$\therefore \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中有 k 对共轭之积为 1, 剩下的 $n-2k$ 个实根 $\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_{n-2k}}$ 之积为 1。

$\because \lambda_{i_s} = \pm 1, \therefore -1$ 的个数必为偶数个, 而 $\dim V$ 为奇数, 因此至少有一个特征值为实数 1

P397 补 3 (仿上题), $\because |A|=-1$, 剩下的 $n-2k$ 个实根之积为 -1, 其中必有特征值 = -1。

P397, 补 4: 令 $r = A(k\alpha + l\beta - kA\alpha - lA\beta)$, $\therefore A$ 得内积

$$\begin{aligned}
& \therefore (\gamma, \gamma) = A(k\alpha + l\beta, A(k\alpha + l\beta)) - (A(k\alpha + l\beta), kA\alpha) - (A(k\alpha + l\beta), lA\beta) \\
& \quad - (kA\alpha, A(k\alpha + l\beta)) + (kA\alpha, kA\alpha) + (k(A\alpha, lA\beta) - (lA\beta, A(k\alpha + l\beta)) \\
& \quad + (lA\beta, kA\alpha) + (lA\beta, lA\beta) \\
& = (k\alpha + l\beta, k\alpha + l\beta) - k(k\alpha + l\beta, \alpha) - l(k\alpha + l\beta, \beta) - k(\alpha, k\alpha + l\beta) + k^2(\alpha, \alpha) + kl(\alpha, \beta) \\
& \quad - l(\beta, k\alpha + l\beta) + kl(\beta, \alpha) + l^2(\beta, \beta) \\
& = (k\alpha + l\beta - k\alpha - l\beta, k\alpha + l\beta - k\alpha - l\beta) = 0, \therefore r = 0 \\
& \text{而 } \forall k, l, \alpha, \beta, A(k\alpha + l\beta) = kA\alpha + lA\beta, \therefore A \in L(V), \text{故 } A \text{ 是正交变换}
\end{aligned}$$

P397 补5, "必要性": $(\beta_i, \beta_j) = (A\alpha_i, A\alpha_j) = (\alpha_i, \alpha_j)$

"充分性"(归纳法) $m=1$ 时, $|\alpha_1| = |\beta_1|$

作标准正交基 $\varepsilon_1 = \frac{1}{|\alpha_1|} \alpha_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 及 $\eta_1 = \frac{1}{|\beta_1|} \beta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 则线性变换 $A: \varepsilon_i \rightarrow \eta_i$

是正交变换, 则 $A|\alpha_1| = A|\beta_1|$, $A\varepsilon_1 = \beta_1$, 而为所求设 $m-1$ 成立, 考虑 m 情形

由假设有正交变换 A_1 , $\alpha_i \rightarrow \beta_i, \alpha_m \rightarrow \tilde{\beta}_m, i = 1, 2, \dots, m-1$, 由于 A_1 保持内积及 Gram 矩阵, 行列式的线性相关系。

$\beta_1, \dots, \beta_{m-1}, \tilde{\beta}_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{m-1}, \beta_m$

任何一个局部的线性关系相同, 设 $W = L(\beta_1, \dots, \beta_{m-1})$

$V_1 = L(\beta_1, \dots, \beta_{m-1}, \tilde{\beta}_m) = W + L(\tilde{\beta}_m), V_2 = L(\beta_1, \dots, \beta_m) = W + L(\beta_m)$

(1) 若 $\tilde{\beta}_m \in W$, 则 $\beta_m \in W$, 设 W 的标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$

$\because (\tilde{\beta}_m, \beta_i) = (\beta_m, \beta_i) \Rightarrow \forall i (\tilde{\beta}_m, \varepsilon_i) = (\beta_m, \varepsilon_i) \Rightarrow \tilde{\beta}_m = \beta_m$, 则 A , 即已为所求

(2) 若 $\tilde{\beta}_m \notin W$, 则 $\beta_m \notin W$, 设 V_1 的标准正交基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \tilde{\varepsilon}_{r+1}$, V_2 的标准正交基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}$, 分别扩充为 V 的标准正交基 $\dots, \tilde{\varepsilon}_{r+1} \dots \tilde{\varepsilon}_n$, 及 $\dots, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$, 作线性变换 A ,

$\varepsilon_i \rightarrow \varepsilon_i, \tilde{\varepsilon}_j \rightarrow \begin{cases} i \leq r \\ j > r \end{cases}$, 是一个正交变换, 而 $\beta_m(\tilde{\beta}_m)$ 用 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}$ (或 $\tilde{\varepsilon}_{r+1}$) 表示时的系数

完全由 β_i, β_j 之间的内积确定, 由充分已知条件, 这些系数对应相等.

$\therefore A_2 \tilde{\beta}_m = A_2(\alpha_1 \varepsilon_1 + \dots + \alpha_r \varepsilon_r + \alpha_{r+1} \tilde{\varepsilon}_{r+1}) = \alpha_1 \varepsilon_1 + \alpha_2 \varepsilon_2 + \dots + \alpha_r \varepsilon_r + \alpha_{r+1} \varepsilon_{r+1} = \beta_m$

且 A_2 在 W 上不动, 即, $A_2 \beta_i = \beta_i (1 \leq i \leq r)$

取 $A = A_2 A_1$ 的合成, 则: $A: \alpha_i \rightarrow \beta_i (i = 1, 2, \dots, m)$

且 A 为正交变换, 即为所求.

P397 补6, $\because A$ 实对称, \therefore 存在 T 正交, 使

$$T'AT = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \text{其中 } \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n, \text{为 } A \text{ 的特征值}$$

$\because A^2 = E, \therefore A$ 的最小多项式为 $x^2 - 1$ 的因式, 故

A 的特征多项式为 $(x-1)^r(x+1)^{n-r}$, 即 A 的特征值为 1 或 -1

\therefore 当 $\lambda_i = \pm 1$, 因此 $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 1, \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = -1$

$$\text{即: } T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_{n-r} \end{pmatrix}$$

P397 补 7, 作正交替换, $X = TY, \therefore X'X' = (Y'T')(TY) = Y'Y$

$$\text{使 } f = X'AX = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2, \quad \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

$$\therefore f = X'AX \leq \lambda_n(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_n Y'Y = \lambda_n X'X$$

$$f = X'AX \geq \lambda_1(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_1 Y'Y = \lambda_1 X'X, \text{ 即得证}$$

P397. 补 8 设 $f = X'AX$, 且正交替换 $X = TY$, 使 ($\lambda_1 = \lambda$)

$$f = \lambda y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \quad \text{令 } Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{X} = TY_0 = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix} \in R^n$$

$$\begin{aligned} \therefore f(\bar{X}) &= f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = \lambda = \lambda Y_0' Y_0 = \lambda ((T' \bar{X})'(T' \bar{X})) \\ &= \lambda (\bar{X}'(TT')\bar{X}) = \lambda (\bar{X}'\bar{X}) = \lambda (\bar{x}_1^2 + \bar{x}_2^2 + \dots + \bar{x}_n^2) \end{aligned}$$

$$\eta = \alpha - \beta \neq 0, \eta_0 = \frac{1}{|\eta|}\eta$$

P397, 补 9①, 取

作镜面反射, $A : \xi \rightarrow \xi - 2(\eta_0 \xi) \eta_0, \forall \xi$

$$\text{则 } A\alpha = \alpha - 2\left(\frac{1}{|\eta|}(\alpha - \beta), \alpha\right)\eta_0 = \alpha - 2\left(\frac{1}{|\eta|}(\alpha - \beta), \alpha\right)\frac{1}{|\eta|}\eta$$

$$\therefore 2\left(\frac{1}{|\eta|}(\alpha - \beta), \alpha\right)\frac{1}{|\eta|} = 2 \frac{(\alpha - \beta, \alpha)}{(\alpha - \beta, \alpha - \beta)} = 2 \frac{|\alpha|^2 - (\alpha, \beta)}{|\alpha|^2 - 2(\alpha, \beta) + |\beta|^2} = 2 \frac{1 - (\alpha, \beta)}{2 - 2(\alpha, \beta)} = 1$$

$\therefore A\alpha = \alpha - \eta = \beta$, 即为所求.

P397, 补 9②, 设正交变换 A , 标准正交基: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \rightarrow \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$

作镜面反射 $B_1 : \varepsilon_1 \rightarrow \eta_1, \varepsilon_i \rightarrow B_1 \varepsilon_i \quad (i > 1)$

$$\therefore L(B\varepsilon_2, B\varepsilon_3, \dots, B\varepsilon_n) = L(\varepsilon_1)^\perp \rightarrow L(\eta_1)^\perp = L(\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n)$$

不妨设 B_K 是一系列镜面反射使:

$$\varepsilon_1 \rightarrow \eta_1, \dots, \varepsilon_k \rightarrow \eta_k, \quad \varepsilon_{k+1} \rightarrow B_k \varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_n \rightarrow B_k \varepsilon_n$$

$$\mathbb{C}_k : \xi_1 = B_k \varepsilon_{k+1} - \eta_{k+1} \quad \xi_0 = \frac{1}{|\xi_1|} \xi_1$$

作一镜面反射

$\mathbb{C}_k : \alpha \rightarrow \alpha - 2(\xi_0, \alpha)\xi_0$ 使 $B\xi_{k+1} \rightarrow \eta_{k+1}$
 $\because (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k), \eta_1, \dots, \eta_k$ 与 ξ_1 正交, $\therefore l_{C_{k,j}}\eta_i \rightarrow \eta_i$ ($1 \leq i \leq k$)
令 $B_{k+1} = C_k B_k$ 是一系列镜面反射之积, 且

$\varepsilon_1 \rightarrow \eta_1, \dots, \varepsilon_k \rightarrow \eta_k, \varepsilon_{k+1} \rightarrow \eta_{k+1}$
继续下去, n 步后必存一系列反射之积 $|B|$ 使

$$\varepsilon_1 \rightarrow \eta_1, \varepsilon_2 \rightarrow \eta_2, \dots, \varepsilon_n \rightarrow \eta_n$$

由线性变换的唯一存在性, $A = B_n$ 是一系列镜面反射之积

P397, 补 10, 设 C 可逆, 使 $C'BC=E$ ($\because B > 0$)

令 $A_1=CAC$, 实对称, 存在正交 Q , 使 $Q'AQ$ 对角形

令 $T=CQ$, 可逆, 则

$$T'AT=Q'(C'AC)Q=Q'AQ, \text{ 对角形}$$

$$T'BT=Q'(C'BC)Q=Q'EQ=E, \text{ 对角形, (证毕)}$$

P398, 补 11, 设: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 及 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 都为标准正交基, 解

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$$

$\because \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 及 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的渡量矩阵都是单位矩阵 E

任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$, $\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)X_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)X_2$

$$\beta = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)Y_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)Y_2$$

其中 $X_1 = AX_2, Y_1 = AY_2$

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= (\sum x_i \varepsilon_i, \sum y_j \varepsilon_j) = \sum x_i \overline{y_j} (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = X_1' \overline{Y_1} = X_2' A' \overline{AY_2} \\ &= (\sum x_i \eta_i, \sum y_j \eta_j) = \sum x_i \overline{y_j} (\eta_i, \eta_j) = X_2' E \overline{Y_2} \end{aligned}$$

由 X_2, Y_2 的任意性, $A' \overline{A} = E$ 故 $\overline{A}' A = E$, 即 A 为酉矩阵

P398 补 12, 设 A 为酉矩阵, λ 为其特征值, $X_0 \neq 0, AX_0 = \lambda X_0$

$$\therefore \overline{AX_0} = \overline{AX_0} = \overline{\lambda X_0} \quad (\overline{AX_0})' = (\overline{\lambda X_0})' = \overline{\lambda}' \overline{X}'_0$$

$$\therefore |\lambda|^2 \overline{X_0}' X_0 = \overline{\lambda X_0}' \quad (\lambda X_0) = (\overline{AX_0})' (AX_0) = \overline{X_0}' (\overline{A}' A) X_0 = \overline{X_0}' X_0$$

$$\therefore \overline{X_0}' X_0 = |X_0|^2 \neq 0 \quad \therefore |\lambda|^2 = 1 \quad \text{即 } |\lambda| = 1$$

P398, 补 13, 设 A 复可逆, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

用 Schmidt 方法, 将基正交化, 为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 可知

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} 1 & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) T_1$$

用将 β_i 单位化, $\gamma_i = \frac{1}{|\beta_i|} \beta_i$ $D = \begin{pmatrix} |\beta_1|^{-1} & & & \\ & |\beta_2|^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & |\beta_n|^{-1} \end{pmatrix}$

可知标准正交基 $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)D$

$$\text{令 } T_2 = T_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} |\beta_1| & & & \\ & |\beta_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |\beta_n| \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)T_1 = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)D^{-1}T_1$$

即为上三角且对角线上全大于 0, ($t_{ii} = |\beta_i| > 0$)

其次, 另设 $A = U_3 T_3$, 一个分解, 则, $U T = U_3 T_3$

$$\tilde{U} = U_3^{-1} U = \overline{U}_3' U = T_3 T^{-1}$$

为上三角的酉矩阵 (类假正 13 题, P9, 138, 10.1 练习 13)

$\therefore \tilde{U}$ 为对角矩阵, 对角线大于 0 $\Rightarrow \tilde{U} = E$

$\therefore T_3 = T, U_3 = U$, (唯一性证毕)

P398, 补 14, $\overline{A}' = A$, 若 λ_0 为特征值, 则有 $X_0 \neq 0, AX_0 = \lambda_0 X_0$

$$\begin{aligned} \lambda_0 \overline{X_0}' X_0 &= \overline{X_0}' (\lambda X_0) = \overline{X_0}' (AX_0) = (\overline{X_0}' A) X_0 = (\overline{X_0}' \overline{A}') X_0 \\ &= (\overline{AX_0})' X_0 = (\overline{\lambda_0 X_0})' X_0 = \overline{\lambda_0} \overline{X_0}' X_0 = \overline{\lambda_0} (\overline{X_0}' X_0) \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{X_0}' X_0 \neq 0 \quad \therefore \lambda_0 = \overline{\lambda_0} \quad \text{故 } \lambda_0 \in \mathbb{R}$$

若 A 有两个特征值 $\lambda \neq \mu$, 且 $X_1 \neq 0, X_2 \neq 0$, 使 $AX_1 = \lambda X_1, AX_2 = \mu X_2$

$$\begin{aligned} \lambda \overline{X_2}' X_1 &= \overline{X_2}' (\lambda X_1) = \overline{X_2}' (AX_1) = (\overline{X_2}' A) X_1 = (\overline{X_2}' \overline{A}') X_1 \\ &= (\overline{AX_2})' X_1 = (\overline{\mu X_2})' X_1 = \overline{\mu} \overline{X_2}' X_1 = \mu (\overline{X_2}' X_1) \\ \therefore \lambda \neq \mu &\quad \therefore \overline{X_2}' X_1 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{即 } (X_1, X_2) = X_1' \overline{X_2} = (X_1' \overline{X_2}') = \overline{X_2}' X_1 = 0, \quad \therefore X_1 \perp X_2$$